

2023 年高考浙江卷化学真题

可能用到的相对原子质量: H-1 Li-7 C-12 N-14 O-16 Na-23 Mg-24 Al-27 Si-28 S-32 Cl-35.5

K-39 Ca-40 Fe-56 Cu-64 Br-80 Ag-108 I-127 Ba-137

一、选择题(本大题共 16 小题, 每小题 3 分, 共 48 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 不选、多选、错选均不得分)

1. 材料是人类赖以生存和发展的物质基础, 下列材料主要成分属于有机物的是


- A. 石墨烯 B. 不锈钢 C. 石英光导纤维 D. 聚酯纤维

2. 下列化学用语表示正确的是

A. H_2S 分子的球棍模型:



B. AlCl_3 的价层电子对互斥模型:



C. KI 的电子式: $\text{K} \begin{array}{c} \square\square \\ \text{I} \\ \square\square \end{array} :$

D. $\text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_2\text{CH}_3)_2$ 的名称: 3-甲基戊烷


3. 氯化铁是一种重要的盐, 下列说法不正确的是

- A. 氯化铁属于弱电解质 B. 氯化铁溶液可腐蚀覆铜板
C. 氯化铁可由铁与氯气反应制得 D. 氯化铁溶液可制备氢氧化铁胶体

4. 物质的性质决定用途, 下列两者对应关系不正确的是

- A. 铝有强还原性, 可用于制作门窗框架
B. 氧化钙易吸水, 可用作干燥剂
C. 维生素 C 具有还原性, 可用作食品抗氧化剂
D. 过氧化钠能与二氧化碳反应生成氧气, 可作潜水艇中的供氧剂

5. 下列说法正确的是



A. 图①装置可用于制取并收集氨气

关注北京高考在线官方微信: **京考一点通** (微信号:bjgkzx), 获取更多试题资料及排名分析信息。

B. 图②操作可排出盛有 KMnO_4 溶液滴定管尖嘴内的气泡

C. 图③操作俯视刻度线定容会导致所配溶液浓度偏大

D. 图④装置盐桥中阳离子向 ZnSO_4 溶液中迁移

6. 化学烫发巧妙利用了头发中蛋白质发生化学反应实现对头发的“定型”，其变化过程示意图如下。下列说法不正确的是



A. 药剂 A 具有还原性

B. ①→②过程若有 2 mol S-S 键断裂，则转移 4 mol 电子

C. ②→③过程若药剂 B 是 H_2O_2 ，其还原产物为 O_2

D. 化学烫发通过改变头发中某些蛋白质中 S-S 键位置来实现头发的定型

7. N_A 为阿伏加德罗常数的值，下列说法正确的是

A. 4.4g $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$ 中含有 σ 键数目最多为 $0.7N_A$

B. 1.7g H_2O_2 中含有氧原子数为 $0.2N_A$

C. 向 1L 0.1mol/L CH_3COOH 溶液通氨气至中性，铵根离子数为 $0.1N_A$

D. 标准状况下，11.2L Cl_2 通入水中，溶液中氯离子数为 $0.5N_A$

8. 下列说法不正确的是

A. 通过 X 射线衍射可测定青蒿素晶体的结构

B. 利用盐析的方法可将蛋白质从溶液中分离

C. 苯酚与甲醛通过加聚反应得到酚醛树脂

D. 可用新制氢氧化铜悬浊液鉴别苯、乙醛和醋酸溶液

9. 下列反应的离子方程式正确的是


A. 碘化亚铁溶液与等物质的量的氯气： $2\text{Fe}^{2+} + 2\text{I}^- + 2\text{Cl}_2 = 2\text{Fe}^{3+} + \text{I}_2 + 4\text{Cl}^-$

B. 向次氯酸钙溶液通入足量二氧化碳： $\text{ClO}^- + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{HClO} + \text{HCO}_3^-$

C. 铜与稀硝酸： $\text{Cu} + 4\text{H}^+ + 2\text{NO}_3^- = \text{Cu}^{2+} + 2\text{NO}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$

D. 向硫化钠溶液通入足量二氧化硫: $S^{2-} + 2SO_2 + 2H_2O = H_2S + 2HSO_3^-$

10. 丙烯可发生如下转化, 下列说法不正确的是



A. 丙烯分子中最多 7 个原子共平面

B. X 的结构简式为 $CH_3CH=CHBr$

C. Y 与足量 KOH 醇溶液共热可生成丙炔

D. 聚合物 Z 的链节为 $\begin{array}{c} -CH_2-CH- \\ | \\ CH_3 \end{array}$

11. X、Y、Z、W 四种短周期主族元素, 原子序数依次增大。X、Y 与 Z 位于同一周期, 且只有 X、Y 元素相邻。X 基态原子核外有 2 个未成对电子, W 原子在同周期中原子半径最大。下列说法不正确的是

A. 第一电离能: $Y > Z > X$

B. 电负性: $Z > Y > X > W$

C. Z、W 原子形成稀有气体电子构型的简单离子的半径: $W < Z$

D. W_2X_2 与水反应生成产物之一是非极性分子

12. 苯甲酸是一种常用的食品防腐剂。某实验小组设计粗苯甲酸(含有少量 NaCl 和泥沙)的提纯方案如下:



下列说法不正确的是


A. 操作 I 中依据苯甲酸的溶解度估算加水量

B. 操作 II 趁热过滤的目的是除去泥沙和 NaCl

C. 操作 III 缓慢冷却结晶可减少杂质被包裹


D. 操作 IV 可用冷水洗涤晶体

13. 氯碱工业能耗大, 通过如图改进的设计可大幅度降低能耗, 下列说法不正确的是



- A. 电极 A 接电源正极，发生氧化反应
- B. 电极 B 的电极反应式为： $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- = \text{H}_2 \uparrow + 2\text{OH}^-$
- C. 应选用阳离子交换膜，在右室获得浓度较高的 NaOH 溶液
- D. 改进设计中通过提高电极 B 上反应物的氧化性来降低电解电压，减少能耗

14. 一定条件下，1-苯基丙炔($\text{Ph}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_3$)可与 HCl 发生催化加成，反应如下：



反应过程中该炔烃及反应产物的占比随时间的变化如图(已知：反应 I、III 为放热反应)，下列说法不正确的是

- A. 反应焓变：反应 I > 反应 II
- B. 反应活化能：反应 I < 反应 II
- C. 增加 HCl 浓度可增加平衡时产物 II 和产物 I 的比例
- D. 选择相对较短的反应时间，及时分离可获得高产率的产物 I

15. 草酸($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$)是二元弱酸。某小组做如下两组实验：

实验 I：往 20 mL $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaHC_2O_4 溶液中滴加 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH 溶液。

实验 II：往 20 mL $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaHC_2O_4 溶液中滴加 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ CaCl_2 溶液。

[已知： $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 的电离常数 $K_{a1}=5.4 \times 10^{-2}$, $K_{a2}=5.4 \times 10^{-5}$, $K_{sp}(\text{CaC}_2\text{O}_4)=2.4 \times 10^{-9}$ ，溶液混合后体积变化忽略不计]，下列说法正确的是

- A. 实验 I 可选用甲基橙作指示剂，指示反应终点
- B. 实验 I 中 $V(\text{NaOH})=10 \text{ mL}$ 时，存在 $c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-}) < c(\text{HC}_2\text{O}_4^-)$

C. 实验Ⅱ中发生反应 $\text{HC}_2\text{O}_4^- + \text{Ca}^{2+} = \text{CaC}_2\text{O}_4 \downarrow + \text{H}^+$

D. 实验Ⅱ中 $V(\text{CaCl}_2) = 80 \text{ mL}$ 时, 溶液中 $c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-}) = 4.0 \times 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

16. 探究卤族元素单质及其化合物的性质, 下列方案设计、现象和结论都正确的是

	实验方案	现象	结论
A	往碘的 CCl_4 溶液中加入等体积浓 KI 溶液, 振荡	分层, 下层由紫红色变为浅粉红色, 上层呈棕黄色	碘在浓 KI 溶液中的溶解能力大于在 CCl_4 中的溶解能力
B	用玻璃棒蘸取次氯酸钠溶液点在 pH 试纸上	试纸变白	次氯酸钠溶液呈中性
C	向 $2 \text{ mL } 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ AgNO}_3$ 溶液中先滴加 4 滴 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ KCl}$ 溶液, 再滴加 4 滴 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ KI}$ 溶液	先产生白色沉淀, 再产生黄色沉淀	AgCl 转化为 AgI , AgI 溶解度小于 AgCl 溶解度
D	取两份新制氯水, 分别滴加 AgNO_3 溶液和淀粉 KI 溶液	前者有白色沉淀, 后者溶液变蓝色	氯气与水的反应存在限度

A. A

B. B


C. C

D. D

非选择题部分

二、非选择题(本大题共 5 小题, 共 52 分)

17. 氮的化合物种类繁多, 应用广泛。



请回答:

(1) 基态 N 原子的价层电子排布式是_____。

(2) 与碳氢化合物类似, N 、 H 两元素之间也可以形成氮烷、氮烯。

①下列说法不正确的是_____。

A. 能量最低的激发态 N 原子的电子排布式: $1s^2 2s^1 2p^3 3s^1$

B. 化学键中离子键成分的百分数: $\text{Ca}_3\text{N}_2 > \text{Mg}_3\text{N}_2$

C. 最简单的氮烯分子式: N_2H_2



D. 氮烷中 N 原子的杂化方式都是 sp^3

②氮和氢形成的无环氮多烯, 设分子中氮原子数为 n , 双键数为 m , 其分子式通式为_____。

③给出 H^+ 的能力: NH_3 _____ $[\text{CuNH}_3]^{2+}$ (填 “>” 或 “<”), 理由是_____。

(3) 某含氮化合物晶胞如图, 其化学式为_____, 每个阴离子团的配位数(紧邻的阳离子数)为_____。

18. 工业上煅烧含硫矿物产生的 SO_2 可以按如下流程脱除或利用。



请回答:

(1) 富氧煅烧燃煤产生的低浓度的 SO_2 可以在炉内添加 CaCO_3 通过途径 I 脱除, 写出反应方程式_____。

(2) 煅烧含硫量高的矿物得到高浓度的 SO_2 , 通过途径 II 最终转化为化合物 A。

①下列说法正确的是_____。


A. 燃煤中的有机硫主要呈正价 B. 化合物 A 具有酸性

C. 化合物 A 是一种无机酸酯 D. 工业上途径 II 产生的 SO_3 也可用浓 H_2SO_4 吸收

②一定压强下, 化合物 A 的沸点低于硫酸的原因是_____。

(3) 设计实验验证化合物 A 中含有 S 元素_____; 写出实验过程中涉及的反应方程式_____。

19. 水煤气变换反应是工业上的重要反应, 可用于制氢。



该反应分两步完成：



$$\Delta H_1 = -47.2 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$



$$\Delta H_2$$

请回答：

(1) $\Delta H_2 =$ _____ $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

(2) 恒定总压 1.70 MPa 和水碳比 $[n(\text{H}_2\text{O})/n(\text{CO})=12:5]$ 投料，在不同条件下达到平衡时 CO_2 和 H_2 的分压 (某成分分压=总压×该成分的物质的量分数) 如下表：

	$p(\text{CO}_2)/\text{MPa}$	$p(\text{H}_2)/\text{MPa}$	$p(\text{CH}_4)/\text{MPa}$
条件 1	0.40	0.40	0
条件 2	0.42	0.36	0.02

①在条件 1 下，水煤气变换反应的平衡常数 $K =$ _____。

②对比条件 1，条件 2 中 H_2 产率下降是因为发生了一个不涉及 CO_2 的副反应，写出该反应方程式_____。

(3) 下列说法正确的是_____。

- A. 通入反应器的原料气中应避免混入 O_2
- B. 恒定水碳比 $[n(\text{H}_2\text{O})/n(\text{CO})]$ ，增加体系总压可提高 H_2 的平衡产率
- C. 通入过量的水蒸气可防止 Fe_3O_4 被进一步还原为 Fe
- D. 通过充入惰性气体增加体系总压，可提高反应速率

(4) 水煤气变换反应是放热的可逆反应，需在多个催化剂反应层间进行降温操作以“去除”反应过程中的余热 (如图 1 所示)，保证反应在最适宜温度附近进行。




图 1




图 2




图 3

①在催化剂活性温度范围内，图 2 中 b-c 段对应降温操作的过程，实现该过程的一种操作方法是_____。

A. 按原水碳比通入冷的原料气 B. 喷入冷水(蒸气) C. 通过热交换器换热

②若采用喷入冷水(蒸气)的方式降温,在图3中作出CO平衡转化率随温度变化的曲线_____。

(5)在催化剂活性温度范围内,水煤气变换反应的历程包含反应物分子在催化剂表面的吸附(快速)、反应及产物分子脱附等过程。随着温度升高,该反应的反应速率先增大后减小,其速率减小的原因是_____。

20. 某研究小组用铝土矿为原料制备絮凝剂聚合氯化铝($[Al_2(OH)_aCl_b]_m$, $a=1\sim5$)按如下流程开展实验。



已知:①铝土矿主要成分为 Al_2O_3 ,含少量 Fe_2O_3 和 SiO_2 。用NaOH溶液溶解铝土矿过程中 SiO_2 转变为难溶性的铝硅酸盐。

② $[Al_2(OH)_aCl_b]_m$ 的絮凝效果可用盐基度衡量,盐基度 $=\frac{a}{a+b}$

当盐基度为0.60~0.85时,絮凝效果较好。

请回答:

(1)步骤1所得滤液中主要溶质的化学式是_____。

(2)下列说法不正确的是_____。


A. 步骤I,反应须在密闭耐高压容器中进行,以实现所需反应温度

B. 步骤II,滤液浓度较大时通入过量 CO_2 有利于减少 $Al(OH)_3$ 沉淀中的杂质

C. 步骤III,为减少 $Al(OH)_3$ 吸附的杂质,洗涤时需对漏斗中的沉淀充分搅拌

D. 步骤中控制 $Al(OH)_3$ 和 $AlCl_3$ 的投料比可控制产品盐基度

(3)步骤V采用如图所示的蒸汽浴加热,仪器A的名称是_____;步骤V不宜用酒精灯直接加热的原因是_____。




(4)测定产品的盐基度。

Cl⁻ 的定量测定：称取一定量样品，配成溶液，移取 25.00 mL。溶液于锥形瓶中，调 pH=6.5~10.5，滴加指示剂 K₂CrO₄ 溶液。在不断摇动下，用 0.1000 mol·L⁻¹ AgNO₃ 标准溶液滴定至浅红色(有 Ag₂CrO₄ 沉淀)，30 秒内不褪色。平行测试 3 次，平均消耗 AgNO₃ 标准溶液 22.50 mL。另测得上述样品溶液中 $c(\text{Al}^{3+})=0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

①产品的盐基度为_____。

②测定 Cl⁻ 过程中溶液 pH 过低或过高均会影响测定结果，原因是_____。

21. 某研究小组按下列路线合成胃动力药依托比利。



请回答：

(1) 化合物 B 的含氧官能团名称是_____。

(2) 下列说法不正确的是_____。

A. 化合物 A 能与 FeCl₃ 发生显色反应


B. A→B 的转变也可用 KMnO₄ 在酸性条件下氧化来实现

C. 在 B+C→D 的反应中，K₂CO₃ 作催化剂

D. 依托比利可在酸性或碱性条件下发生水解反应

(3) 化合物 C 的结构简式是_____。

(4) 写出 E→F 的化学方程式_____。

(5) 研究小组在实验室用苯甲醛为原料合成药物 N-苄基苯甲酰胺()利用以上合成线路中的

相关信息，设计该合成路线_____ (用流程图表示，无机试剂任选)

关注北京高考在线官方微信：京考一点通 (微信号:bjgkzx)，获取更多试题资料及排名分析信息。

(6) 写出同时符合下列条件的化合物 D 的同分异构体的结构简式_____。

①分子中含有苯环

② $^1\text{H-NMR}$ 谱和 IR 谱检测表明：分子中共有 4 种不同化学环境的氢原子，有酰胺基($\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ -\text{C}-\text{NH}_2 \end{array}$)。

2023 年高考浙江卷化学答案

可能用到的相对原子质量：H-1 Li-7 C-12 N-14 O-16 Na-23 Mg-24 Al-27 Si-28 S-32 Cl-35.5

K-39 Ca-40 Fe-56 Cu-64 Br-80 Ag-108 I-127 Ba-137

一、选择题(本大题共 16 小题，每小题 3 分，共 48 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分)

1	2	3	4	5	6
D	D	A	A	C	C
7	8	9	10	11	12
A	C	B	B	A	B
13	14	15	16		
B	C	D	A		

非选择题部分

二、非选择题(本大题共 5 小题，共 52 分)

【17 题答案】

【答案】(1) $2s^2 2p^3$

(2) ①. A ②. $N_n H_{n+2-2m}$ ($m \leq \frac{n}{2}$, m 为正整数) ③. < ④. $[CuNH_3]^{2+}$ 形成配位键后，由于 Cu 对电子的吸引，使得电子云向铜偏移，进一步使氮氢键的极性变大，故其更易断裂

(3) ①. $CaCN_2$ ②. 6


【18 题答案】

【答案】(1) $2SO_2 + O_2 + 2CaCO_3 \xrightarrow{\text{高温}} 2CaSO_4 + 2CO_2$

(2) ①. BCD ②. 硫酸分子能形成更多的分子间氢键

(3) ①. 取化合物 A 加入足量氢氧化钠，反应完全后加入盐酸酸化，无明显现象，再加入氯化钡生成

白色沉淀，说明 A 中含有 S 元素




$\text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{BaCl}_2 = \text{BaSO}_4 \downarrow + 2\text{NaCl}$

【19 题答案】

【答案】(1) 6 (2) ①. 2 ②. $\text{CO} + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons \text{CH}_4 + \text{H}_2\text{O}$ (3) AC

(4) ①. AC ②.



(5) 温度过高时, 不利于反应物分子在催化剂表面的吸附, 从而导致其反应物分子在催化剂表面的吸附量及浓度降低, 反应速率减小; 温度过高还会导致催化剂的活性降低, 从而使化学反应速率减小

【20 题答案】

【答案】(1) NaAlO_2 (2) C





(3) ①. 蒸发皿 ②. 酒精灯直接加热受热不均匀, 会导致产品盐基度不均匀

(4) ①. 0.7 ②. pH 过低, 指示剂会与氢离子反应生成重铬酸跟, 会氧化氯离子, 导致消耗的硝酸银偏少, 而 pH 过高, 氢氧根会与银离子反应, 导致消耗的硝酸银偏多

【21 题答案】

【答案】(1) 羟基、醛基 (2) BC

(3) $\text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{N}(\text{CH}_3)_2$



关于我们

北京高考在线创办于 2014 年，隶属于北京太星网络科技有限公司，是北京地区极具影响力的中学升学服务平台。主营业务涵盖：北京新高考、高中生涯规划、志愿填报、强基计划、综合评价招生和学科竞赛等。

北京高考在线旗下拥有网站门户、微信公众平台等全媒体矩阵生态平台。平台活跃用户 40W+，网站年度流量数千万量级。用户群体立足于北京，辐射全国 31 省市。

北京高考在线平台一直秉承 “精益求精、专业严谨” 的建设理念，不断探索 “K12 教育+互联网+大数据” 的运营模式，尝试基于大数据理论为广大中学和家长提供新鲜的高考资讯、专业的高考政策解读、科学的升学规划等，为广大高校、中学和教科研单位提供 “衔接和桥梁纽带” 作用。

平台自创办以来，为众多重点大学发现和推荐优秀生源，和北京近百所中学达成合作关系，累计举办线上线下升学公益讲座数百场，帮助数十万考生顺利通过考入理想大学，在家长、考生、中学和社会各界具有广泛的口碑影响力

未来，北京高考在线平台将立足于北京新高考改革，基于对北京高考政策研究及北京高校资源优势，更好的服务全国高中家长和学生。



微信搜一搜



京考一点通