

高一数学

2023 年 11 月

本试卷共 4 页，共 150 分。考试时长 120 分钟。考生务必将答案答在答题卡上，在试卷上作答无效。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

第一部分 (选择题, 共 40 分)

一、选择题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分，在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. 已知集合 $A = \{x \mid x = 2k + 1, k \in \mathbf{Z}\}$, $B = \{x \mid -2 < x < 4\}$, 那么 $A \cap B =$
 (A) $\{-1, 1\}$ (B) $\{1, 3\}$ (C) $\{-1, 1, 3\}$ (D) $\{0, 2, 4\}$

2. 函数 $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$ 的定义域为
 (A) $(-1, 1)$ (B) $[-1, 1]$
 (C) $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ (D) $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$

3. 下列函数中，在定义域内既是奇函数，又是增函数的是
 (A) $y = x^2$ (B) $y = x + 1$ (C) $y = -\frac{1}{x}$ (D) $y = x^3$

4. 已知 $x > 0$, 则 $x + \frac{9}{x}$ 的最小值为
 (A) -3 (B) 3 (C) 6 (D) 10

5. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & x \geq 1, \\ x - 2, & x < 1. \end{cases}$ 若 $f(a) = 3$, 则 $a =$
 (A) ± 2 (B) 2 (C) -2 (D) 5

6. 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $[-6, 6]$ 上的偶函数，且在 $[0, 6]$ 上单调递增. 以下结论正确的是
 (A) $f(-5) > f(\pi) > f(-2)$ (B) $f(\pi) > f(-2) > f(-5)$
 (C) $f(\pi) > f(-5) > f(-2)$ (D) $f(-5) > f(-2) > f(\pi)$

7. 已知函数 $y = f(x)$ 图象是连续不断的，并且是 \mathbf{R} 上的增函数，有如下的对应值表

x	1	2	3	4
y	-0.24	1.21	3.79	10.28


以下说法中错误的是

(A) $f(0) < 0$ (B) 当 $x > 2$ 时, $f(x) > 0$
 (C) 函数 $f(x)$ 有且仅有一个零点 (D) 函数 $g(x) = f(x) + x$ 可能无零点

8. 已知 $f(x)$ 是定义在 \mathbf{R} 上的函数, 那么“存在实数 M , 使得对任意 $x \in \mathbf{R}$ 总有 $f(x) \leq M$ ”是“函数 $f(x)$ 存在最大值”的

- (A) 充分不必要条件 (B) 必要不充分条件
(C) 充要条件 (D) 既不充分也不必要条件

9. 数学里有一种证明方法为无字证明, 是指仅用图形而无需文字解释就能不证自明的数学命题. 在同一平面内有形状、大小相同的图 1 和图 2, 其中四边形 $ABCD$ 为矩形, $\triangle BCE$ 为等腰直角三角形, 设 $AB = \sqrt{a}, BC = \sqrt{b} (b \geq a > 0)$, 则借助这两个图形可以直接无字证明的不等式是



- (A) $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ (B) $\frac{2ab}{a+b} \leq \sqrt{ab}$
(C) $a^2 + b^2 \geq 2\sqrt{ab}$ (D) $\frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}}$

10. 将 5 个 1, 5 个 2, 5 个 3, 5 个 4, 5 个 5 共 25 个数填入一个 5 行 5 列的表格内 (每格填入 1 个数), 使得同一行中任何两数之差的绝对值不超过 2, 设第 k 行的所有数的和为 $r_k (k = 1, 2, 3, 4, 5)$, m 为 r_1, r_2, r_3, r_4, r_5 中的最小值, 则 m 的最大值为

- (A) 8 (B) 9 (C) 10 (D) 11

第二部分 (非选择题, 共 110 分)

二、填空题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分。

11. 已知命题 $p: \exists x \in \mathbf{R}, x^2 - x + 1 < 0$, 则 $\neg p$: _____.

12. 已知 a, b, c 为实数, 能说明“若 $a > b > c$, 则 $a^2 > bc$ ”为假命题的一组 a, b, c 的值是 _____.

13. 函数 $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$ 的图象的对称中心是 _____, 不等式 $f(x) \geq -1$ 的解集是 _____.

14. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 4x + 3, & x \in (-\infty, 0], \\ |\frac{1}{x} - 1|, & x \in (0, +\infty). \end{cases}$ 若关于 x 的方程 $f(x) = t$ 有 4 个不同的实数

根 $x_1, x_2, x_3, x_4 (x_1 < x_2 < x_3 < x_4)$, 则 t 的取值范围是 _____, 若 $x_1 + x_2 + x_3 x_4 = 0$, 则 $t =$ _____.

15. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $[0, 1]$, 且满足下列条件:

(1) 对任意的 $x \in [0, 1]$, 总有 $f(x) \geq 3$, 且 $f(1) = 4$;

(2) 若 $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 \leq 1$, 则有 $f(x_1 + x_2) \geq f(x_1) + f(x_2) - 3$.

给出下列四个结论:


- ① $f\left(\frac{1}{2}\right) \leq \frac{7}{2}$;
② $f(0)$ 可能为区间 $[3, 4]$ 中的任意值;
③ 函数 $f(x)$ 的最大值是 4;
④ 当 $x \in \left(\frac{1}{3^2}, \frac{1}{3}\right]$ 时, $f(x) < 3x + 3$.

其中所有正确结论的序号是 _____.

三、解答题共 6 小题，共 85 分。解答题应写出文字说明，验算步骤或证明过程。

16. (15 分)

已知 $f(x)$ 是 \mathbf{R} 上的奇函数，当 $x > 0$ 时， $f(x) = x^2 - 3x + 2$.
现已作出函数 $f(x)$ 在 y 轴右侧的图象，如图所示.



- (I) 请根据条件，将函数 $f(x)$ 的图象补充完整，并直接写出函数 $f(x)$ 的表达式；
- (II) 写出函数 $f(x)$ 的单调区间，并利用单调性的定义证明函数 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减；
- (III) 直接写出不等式 $(x - 1)f(x) > 0$ 的解集.

17. (15 分)

已知集合 $A = \{x | |x - 1| < 2\}$, $B = \{x | x^2 - 6ax + 5a^2 < 0\}$.

- (I) 若 $a = 1$, 求 $A \cup B$;
- (II) 请在条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知，使得至少存在一个实数 a 满足该条件，并求出 a 的范围.
- ① $A \cap B = B$; ② $A \cup B = B$; ③ $\complement_{\mathbf{R}} A \subseteq \complement_{\mathbf{R}} B$.

注：如果选择多个符合要求的条件分别解答，按第一个解答计分.

18. (14 分)

已知关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} 2x^2 + y^2 = 2, \\ y = kx + 1, \end{cases}$ 其中 $k \in \mathbf{R}$.

- (I) 当 $k = 1$ 时，求该方程组的解；
- (II) 证明：无论 k 为何值，该方程组总有两组不同的解；
- (III) 记该方程组的两组不同的解分别为 $\begin{cases} x = x_1, \\ y = y_1, \end{cases}$ 和 $\begin{cases} x = x_2, \\ y = y_2, \end{cases}$ 判断 $3(y_1 + y_2) - 2y_1y_2$ 是否为定值. 若为定值，请求出该值；若不是定值，请说明理由.

19. (13 分)

某厂家为开拓市场, 拟对广告宣传方面的投入进行调整. 经调查测算, 产品的年订购量 t (万件) 与广告费用 x (万元) 之间的关系为 $t = 25 - \frac{k}{x+2}$. 已知当广告费用投入为 6 万元时, 产品订购量为 19 万件. 该厂家每生产 1 万件该产品, 需投入 12 万元. 另外, 厂家每年还需投入 30 万元用于生产线的维护. 规定年总成本为生产投入费用、维护投入费用、广告费用的总和.

- (I) 求 k 的值;
- (II) 试求该厂家的年总成本 y (万元) 与广告费用 x (万元) 之间的函数关系式;
- (III) 假定年生产成本为生产投入费用、维护投入费用的和. 若每件产品的售价定为产品的年平均生产成本的 2 倍, 当广告费用为多少万元时, 厂家的年利润最高?

20. (14 分)

已知函数 $f(x) = x|x - a| + 2x$, $a \geq 0$.

- (I) 证明: 当 $a = 0$ 时, $f(x)$ 是奇函数;
- (II) 若函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 求 a 的取值范围;
- (III) 若对任意 $x \in [1, 2]$, 关于 x 的不等式 $f(x) < 2x + 1$ 恒成立, 求 a 的取值范围.

21. (14 分)

对任意非空数集 A , 定义 $\Omega(A) = \{\pi(X) \mid X \subseteq A \text{ 且 } X \neq \emptyset\}$, 其中 $\pi(X)$ 表示非空数集 X 中所有元素的积. 特别地, 如果 $X = \{x\}$, 规定 $\pi(X) = x$.

- (I) 若 $A_1 = \left\{\frac{1}{2}, 1, 4\right\}$, $A_2 = \{2, 3, 5\}$, 请直接写出集合 $\Omega(A_1)$ 和 $\Omega(A_2)$ 中元素的个数;
- (II) 若 $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$, 其中 a_i 是正整数 ($i = 1, 2, 3, 4, 5$), 求集合 $\Omega(A)$ 中元素个数的最大值和最小值, 并说明理由;
- (III) 若 $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7\}$, 其中 a_i 是正实数 ($i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$), 求集合 $\Omega(A)$ 中元素个数的最小值, 并说明理由.

答案

一、选择题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分，在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	B	D	C	B	A	D	B	A	C

二、填空题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

11. $\forall x \in \mathbf{R}, x^2 - x + 1 \geq 0.$

12. 答案不唯一，如 $a = 1, b = -1, c = -2.$

13. $(1, 1), (-\infty, 0] \cup (1, +\infty).$

14. $(0, 1), \frac{\sqrt{3}}{2}.$

15. ①③④.

13,14 题第一个空 3 分，第二个空 2 分，15 题的采分点为 0,2,3,5 分，有错误不给分。

三、解答题共 6 小题，共 85 分。解答题应写出文字说明，验算步骤或证明过程。

16. 解：(I) 图象如图，..... 2 分

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x + 2, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -x^2 - 3x - 2, & x < 0. \end{cases} \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

(II) 单调增区间是 $(-\infty, -\frac{3}{2}), (\frac{3}{2}, +\infty),$

单调减区间是 $(-\frac{3}{2}, 0), (0, \frac{3}{2}), \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$

证： $\forall x_1, x_2 \in (0, 1),$ 不妨设 $x_1 < x_2,$

$$f(x_1) - f(x_2) = x_1^2 - 3x_1 + 2 - (x_2^2 - 3x_2 + 2) = (x_1 - x_2)(x_1 + x_2 - 3),$$

因为 $x_1 + x_2 - 3 < 0, x_1 - x_2 < 0,$

所以， $f(x_1) - f(x_2) > 0,$ 即 $f(x_1) > f(x_2),$

因此， $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减..... 3 分

解集为 $(-\infty, -2) \cup (-1, 0) \cup (2, +\infty).$ 3 分

17. 解：(I) $A = (-1, 3), \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$


当 $a = 1$ 时， $B = (1, 5), \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

因此， $A \cup B = (-1, 5). \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

(II) 选择条件①或③，..... 1 分

由条件可得 $B \subseteq A, \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

当 $a = 0$ 时， $B = \emptyset,$ 满足题意；..... 2 分



当 $a > 0$ 时, $B = (a, 5a)$,

所以, $5a \leq 3$, 即 $a \leq \frac{3}{5}$, 所以, $0 < a \leq \frac{3}{5}$ 2分

当 $a < 0$ 时, $B = (5a, a)$,

所以, $5a \geq -1$, 即 $a \geq -\frac{1}{5}$, 所以, $-\frac{1}{5} \leq a < 0$ 2分

综上所述, a 的取值范围是 $[-\frac{1}{5}, \frac{3}{5}]$ 1分

18. 解: (I) 当 $k = 1$ 时, 消去 y , 得 $3x^2 + 2x - 1 = 0$, 2分

解得 $x_1 = -1, x_2 = \frac{1}{3}$,

因此, 方程组的解为 $\begin{cases} x = -1, \\ y = 0 \end{cases}$ 和 $\begin{cases} x = \frac{1}{3}, \\ y = \frac{4}{3} \end{cases}$ 2分

(II) 消去 y , 得 $(k^2 + 2)x^2 + 2kx - 1 = 0$, 1分

$\Delta = 8k^2 + 8 > 0$, 2分

因此, 该方程有两个不同的解, 该方程组也对应有两组不同的解. 1分

(II) 由韦达定理得 $x_1 + x_2 = -\frac{2k}{k^2 + 2}, x_1x_2 = -\frac{1}{k^2 + 2}$, 2分

$y_1 + y_2 = k(x_1 + x_2) + 2 = \frac{4}{k^2 + 2}$, 1分

$y_1y_2 = k^2x_1x_2 + k(x_1 + x_2) + 1 = \frac{-2k^2 + 2}{k^2 + 2}$, 1分

所以, $3(y_1 + y_2) - 2y_1y_2 = \frac{12}{k^2 + 2} - \frac{-4k^2 + 4}{k^2 + 2} = 4$, 1分

因此, 是定值, 且定值为 4. 1分

19. 解:(I) 当 $x = 6$ 时, $t = 25 - \frac{k}{6 + 2} = 19$, 解得 $k = 48$, 2分

(II) $y = 30 + x + 12(25 - \frac{48}{x + 2}), x \geq 0$ 3分

(III) 设年利润为 W 万元,

则 $W = \frac{y - x}{t} \cdot 2t - y = y - 2x = 30 - x + 300 - \frac{576}{x + 2} = 332 - (x + 2 + \frac{576}{x + 2})$, 6分

当且仅当 $x + 2 = 24, x = 22$ 时, W 取最大值 284. 2分

20. 解: (I) 当 $a = 0$ 时, $f(x) = x|x| + 2x$,

$f(-x) = -x|-x| - 2x = -f(x)$,

因此, $f(x)$ 是 \mathbf{R} 上的奇函数. 3分

(II) $f(x) = \begin{cases} x^2 + (2 - a)x, & x \geq a, \\ -x^2 + (2 + a)x, & x < a. \end{cases}$ 2分

当 $x \geq a$ 时, $\frac{a - 2}{2} \leq a$, 解得 $a \geq -2$; 2分

当 $x < a$ 时, $\frac{a+2}{2} \geq a$, 解得 $a \leq 2$; 2 分

所以, a 的取值范围是 $[0, 2]$.

(III) 因为 $f(x) < 2x + 1$ 在 $x \in [1, 2]$ 恒成立, 即 $x|x-a| < 1, x \in [1, 2]$,

所以, $x - \frac{1}{x} < a < x + \frac{1}{x}$ 恒成立, 2 分

考虑 $x - \frac{1}{x} \in [0, \frac{3}{2}]$, $x + \frac{1}{x} \in [2, \frac{10}{3}]$, 2 分

所以, a 的取值范围是 $(\frac{3}{2}, 2)$ 1 分

21. 解: (I) $\Omega(A_1)$ 中有 4 个元素, $\Omega(A_2)$ 中有 7 个元素. 4 分

(II) $\Omega(A)$ 中元素个数的最大值是 31, 最小值是 11. 2 分

集合 A 的非空子集有 $2^5 - 1 = 31$ 个, 因此, $\Omega(A)$ 中最多有 31 个元素.

集合 $A = \{2, 3, 5, 7, 11\}$, A 中任意两个不同子集元素的乘积不同,

此时, $\Omega(A)$ 中有 31 个元素. 1 分

不妨设 $1 \leq a_1 < a_2 < a_3 < a_4 < a_5$,

则 $a_1 < a_2 < a_3 < a_4 < a_5 < a_2 \cdot a_5 < a_3 \cdot a_5 < a_4 \cdot a_5 < a_2 \cdot a_4 \cdot a_5 < a_3 \cdot a_4 \cdot a_5 < a_2 \cdot a_3 \cdot a_4 \cdot a_5$,

所以, $\Omega(A)$ 中至少 11 个元素.

$A = \{1, 2, 4, 8, 16\}, \Omega(A_1) = \{1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024\}$,

此时, $\Omega(A)$ 中有 11 个元素. 2 分

(III) $\Omega(A)$ 中最少有 13 个元素. 1 分

如 $A = \{\frac{1}{8}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 1, 2, 4, 8\}$, $\Omega(A) = \{\frac{1}{64}, \frac{1}{32}, \frac{1}{16}, \frac{1}{8}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64\}$,

此时, $\Omega(A)$ 中有 13 个元素. 1 分

证明如下: 记 $|A|$ 表示集合 A 中的元素个数,

对集合 A 按照如下分类:

$$A_1 = \{a \mid a \in A, a < 1\},$$

$$A_2 = \{a \mid a \in A, a = 1\},$$

$$A_3 = \{a \mid a \in A, a > 1\},$$

设 $|A_1| = x, |A_2| = y, |A_3| = z$, 则 $x + y + z = 7, y \leq 1, x + z \geq 6$. 设 $B = \Omega(A)$, 再对集合 B 按照如下分类:

$$B_1 = \{b \mid b \in B, b < 1\},$$

$$B_2 = \{b \mid b \in B, b = 1\},$$

$$B_3 = \{b \mid b \in BA, b > 1\},$$

设 $|B_1| = p, |B_2| = q, |B_3| = r$,

设 $A_1 = \{a_1, a_2, \dots, a_x\}$, 其中, $a_1 < a_2 < \dots < a_x < 1$, 则

$$a_1 a_2 \dots a_x < a_1 a_2 a_3 < \dots < a_1 a_2 a_x < a_1 a_2 < a_1 a_3 < a_1 a_x < a_1 < a_2 < \dots < a_x < 1,$$

故 $p \geq x + (x-1) + (x-2) + \dots + 1 = \frac{1}{2}x(x+1)$, 1 分

同理可证, $r \geq z + (z-1) + (z-2) + \dots + 1 = \frac{1}{2}z(z+1)$,

而 $q \geq y$, 因此,

$$\begin{aligned} p+q+r &\geq \frac{1}{2}x(x+1) + \frac{1}{2}z(z+1) + y = \frac{1}{2}(x^2+x+z^2+z+2y) \\ &= \frac{1}{2}(x^2-x+z^2-z+14) = \frac{1}{2}[(x+z)^2 - (x+z) - 2xz] + 7, \\ &\geq \frac{1}{2}\left[(x+z)^2 - (x+z) - \frac{(x+z)^2}{2}\right] + 7 = \frac{1}{4}[(x+z)^2 - 2(x+z)] + 7, \end{aligned}$$

..... 1 分

注意到 $6 \leq x+z \leq 7$,

所以, $p+q+r \geq \frac{1}{4}(6^2 - 2 \times 6) + 7 = 13$,

当且仅当 $x=z=3, y=1$ 时, 等号成立, 1 分

因此, $\Omega(A)$ 中最少有 13 个元素.

北京高一高二高三期中试题下载

京考一点通团队整理了【**2023年10-11月北京各区各年级期中试题 & 答案汇总**】专题，及时更新最新试题及答案。

通过【**京考一点通**】公众号，对话框回复【**期中**】或者点击公众号底部栏目<**试题专区**>，进入各年级汇总专题，查看并下载电子版试题及答案！

