

成都市 2019 级高中毕业班第二次诊断性检测

理科综合参考答案及评分意见

第 I 卷(选择题,共 126 分)

一、选择题

1. D 2. A 3. C 4. B 5. C 6. D 7. A 8. D
9. C 10. B 11. D 12. C 13. D

二、选择题

14. B 15. D 16. C 17. D 18. A 19. BC 20. BD 21. AD

第 II 卷(非选择题,共 174 分)

三、非选择题

(一) 必考题

22. (6 分)

(1) R_2 (1 分)

(2) 30.0 或 30 (1 分) 小于 (1 分)

(3) 串联 (1 分) 470.0 或 470 (2 分)

23. (9 分)

(1) ① 初速度为零的匀加速或匀加速 (1 分)

② 2 (1 分) ③ 1 (1 分) 5 (1 分)

(2) 见答图 1 (2 分) (说明: 0~0.40 s 的图线为抛物线; 0.40 s 后的图线为倾斜直线。各 1 分)

(3) ① 0.5 (1 分) ② 0.45 (2 分)

24. (12 分)

解: (1) 木板固定时, 滑块做匀减速直线运动, 所受摩擦力大小为: $f = \mu mg$

$$\text{由动能定理有: } -\mu mgL = \frac{1}{2}m\left(\frac{v_0}{3}\right)^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 \quad (3 \text{ 分})$$


$$\text{解得: } \mu = \frac{4v_0^2}{9gL} \quad (1 \text{ 分})$$

(2) 木板不固定时, 木板和滑块系统在相互作用过程中动量守恒, 设两者共速时的速度为 v

$$\text{由能量守恒定律有: } Q = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}(m+M)v^2 \quad (1 \text{ 分})$$

$$Q = \mu mgL \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{对木板和滑块系统, 由动量守恒定律有: } mv_0 = (m+M)v \quad (1 \text{ 分})$$



答图 1

联立两式解得: $M = 8m$

(1分)

(3) 规定水平向右的方向为正方向

木板固定时,由动量定理有: $I_1 = m(\frac{v_0}{3}) - mv_0 = -\frac{2}{3}mv_0$

(1分)

木板不固定时: $v = \frac{mv_0}{m+M} = \frac{v_0}{9}$

(1分)

由动量定理有: $I_2 = mv - mv_0 = m(\frac{v_0}{9}) - mv_0 = -\frac{8}{9}mv_0$

(1分)

解得: $I_1 : I_2 = 3 : 4$

(1分)

(其他合理解法,参照给分)

25. (20分)

解:(1) 进入第一个区域P前,粒子做自由落体运动,有: $v_1^2 = 2gd$

(1分)

代入数据解得: $v_1 = 2 \text{ m/s}$

(1分)

在区域P中,粒子所受重力、电场力的合力为: $F = qE - mg = 0$

(1分)

所以,粒子在区域P中做匀速圆周运动

粒子穿出第一个区域P时,设 v_1 与x轴正方向的夹角为 θ 。其运动轨迹如答图2所示

由题意: $v_{1x} = v_1 \cos\theta$

(1分)

设粒子在该区域内的轨道半径为 r_1

由牛顿第二定律有: $qv_1B = m \frac{v_1^2}{r_1}$

(1分)


由几何关系有: $d = r_1 \cos\theta$

(1分)

联立得: $v_{1x} = \frac{qBd}{m}$

代入数据解得: $v_{1x} = 0.2 \text{ m/s}$

(1分)



答图2

(2) 进入第n($n > 1$)个区域P前的过程中,由动能定理有: $nmgd = \frac{1}{2}mv_n^2$

(1分)

解得: $v_n = \sqrt{2ngd} = 2\sqrt{n} \text{ m/s}$ ($n = 2, 3, 4, 5 \dots$)

(1分)

设粒子进入、穿出第n($n > 1$)个区域P时, v_n 与x轴正方向的夹角分别为 α 、 β , 轨道半径为 r_n 。其运动轨迹如答图3所示

由题意: $\Delta v_{nx} = v_n \cos\beta - v_n \cos\alpha$

(1分)

由牛顿第二定律有: $qv_nB = m \frac{v_n^2}{r_n}$

(1分)

由几何关系有: $d = r_n \cos\beta - r_n \cos\alpha$


(1分)

联立得: $\Delta v_{nx} = \frac{qBd}{m}$

(1分)

代入数据解得: $\Delta v_{nx} = 0.2 \text{ m/s}$

(1分)



答图3

(3) 设粒子刚好不能从第 n 个区域 P 内穿出, 其满足的条件是粒子在该区域的轨迹恰好与下边界相切, 即在下边界的速度 v_n 沿 x 轴正方向

故: $v_{nx} = v_n$ (1 分)

从粒子进入第一个区域 P 到刚好不能从第 n 个区域 P 内穿出的整个过程中, 粒子在水平方向的速度分量的变化量为: $\Delta v_{nx} = v_{nx}$ (1 分)

因 Δv_{nx} 恒定, 故: $\Delta v_{nx} = n \Delta v_{nx}$ (1 分)

即: $n \Delta v_{nx} = v_{nx} = v_n$

故: $n \frac{qBd}{m} = \sqrt{2ngd}$ (或 $0.2n = 2\sqrt{n}$) (1 分)

即: $n = \frac{2m^2 g}{q^2 B^2 d}$ (或 $0.04n^2 = 4n$)

带入数据得: $n = 100$ (1 分)

故粒子不能从第 100 个区域 P 的下方穿出 (1 分)

(其他合理解法, 参照给分)

26. (共 15 分)

(1) 提高尿素的转化率 (2 分)

(2) 水浴加热 (2 分) 用温度计监测水浴温度(或其它合理方法) (2 分) A (1 分)

(3) 铁、铜离子催化 H_2O_2 分解 (2 分)

(4) 加适量水溶解, 恢复至室温 (1 分) 锥形瓶 (1 分)

(5) 2 : 5 (2 分) $235bc/a$ (2 分)

27. (共 14 分)

(1) 80℃、90min (2 分, 各 1 分)

(2) Fe^{2+} (2 分)




(3) $Fe(OH)_3$ 、 CoS 、 NiS (2 分)

(4) 结合 HCO_3^- 电离出的 H^+ , 促进 $MnCO_3$ 沉淀 (或调 pH) (2 分)

可能产生 $Mn(OH)_2$ 沉淀等, 造成 $MnCO_3$ 纯度降低 (1 分)

$MnCO_3$ 可能溶解, 造成产率降低 (1 分)



28. (共 14 分)

(1) -286 (2 分)

(2) $\frac{0.95 \times 0.95}{0.05 \times 9.05}$ (2 分)

(3) 反应速率较低 (1 分)

可能发生副反应 (2 分, 如苯酚被过度氧化, 或其它合理答案也可得分)

(4) 不可(1分) 催化剂失活(2分)

(5) 1(1分) 1(1分) C D(2分,各1分)

29.(10分)

(1)基质(1分) CO_2 浓度、光照强度(2分)

(2)大于(1分) BR能增加Rubisco含量使暗反应速率加快;BR能降低酸雨对叶绿体类囊体薄膜的损伤程度,保证光反应正常进行(4分)

(3)给植物细胞传达调节代谢的信息,进而影响相关基因的表达(2分)

30.(8分)

(1)低(1分) 环境条件恶劣,遭到破坏后不易恢复原状(1分)

(2)捕食、竞争、寄生、互利共生(2分) 白鳍豚所摄取的能量一部分通过粪便流入了分解者,一部分通过呼吸散失了(2分)

(3)引入生物对长江流域环境的适应能力(1分) 引入生物对本土生物的影响(1分)

31.(9分)

(1)神经调节(1分) 肝脏、下丘脑、垂体(3分) 肾上腺素、糖皮质激素(2分)

(2)缺乏空白对照组(或没有前后自身对照);未设置不受惊吓但注射糖皮质激素的实验组;不能排除肾上腺素对胰高血糖素分泌的影响;不能排除惊吓刺激能否直接促进胰高血糖素分泌(3分)

32.(12分)

(1)隐性(1分) aaBb(2分) 灰体短刚毛(2分)

(2)②(1分) 丙果蝇的基因型为AaBb,能够产生四种比例均等的配子(2分)

(3)方案1:选择第①组F₁代中的灰体短刚毛果蝇与黑体长刚毛果蝇进行杂交,观察并统计子代的表现型及比例(2分) 子代灰体长刚毛:灰体短刚毛:黑体长刚毛:黑体短刚毛=1:1:1:1(2分)

方案2:选择第①组F₁代中的灰体短刚毛雌、雄果蝇进行杂交,观察并统计子代的表现型及比例(2分) 子代灰体短刚毛:灰体长刚毛:黑体短刚毛:黑体长刚毛=9:3:3:1(2分)

(二)选考题

33. [物理——选修3—3](15分)

(1)(5分)ACE

(2)(10分)解:(1)a到b为等温过程,由波意尔定律有: $p_aV_a = p_bV_b$ (1分)

将 $p_a = 3 \times 10^5 \text{ Pa}$ 、 $p_b = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$ 、 $V_b = 24 \text{ L}$ 代入方程解得: $V_a = 8 \text{ L}$ (1分)

b到c为等压过程,由盖—吕萨克定律有: $\frac{V_b}{T_b} = \frac{V_c}{T_c}$ (1分)

将 $V_b = 24 \text{ L}$, $T_b = 297 \text{ K}$, $V_c = V_a = 8 \text{ L}$ 代入方程解得: $T_c = 99 \text{ K}$

(1分)

(ii) 对 b 到 c 为等压压缩过程, 外界对气体做功: $W = p_b(V_b - V_c)$

(1分)

代入数据解得: $W = 1.6 \times 10^3 \text{ J}$

(1分)

由于温度降低, 该过程中气体内能减小, 故: $\Delta U = -2 \times 10^4 \text{ J}$

(1分)

由热力学第一定律有: $\Delta U = W + (-Q)$

(2分)

解得: $Q = 2.16 \times 10^4 \text{ J}$

(1分)

(其他合理解法, 参照给分)

34. [物理——选修 3—4](15 分)


(1)(5分) 10(2分) 0.6(2分) 20(1分)

(2)(10分) 解: (i) 光路如答图 4 所示

因光恰好在 BD 边的中点 F 发生全反射, 故临界角: $C = \angle B = 60^\circ$

(1分)

(1分)



答图4

$$\text{由: } \sin C = \frac{1}{n}$$

$$\text{得: } n = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

(1分)

光在 AD 边上 G 点的入射角 $i = 90^\circ - (180^\circ - 30^\circ - 75^\circ) = 15^\circ$

因 $i < 60^\circ$, 故光在 G 点第一次射出三棱镜

(1分)

设折射角为 r , 由折射定律有: $n = \frac{\sin r}{\sin i}$

(1分)

$$\text{解得: } \sin r = \frac{3\sqrt{2} - \sqrt{6}}{6}$$

(1分)

(ii) 光在三棱镜中的光速为: $v = \frac{c}{n}$

(1分)

由几何关系有: $EF = BE \tan 60^\circ = \sqrt{3}L$

因 $\angle D = \angle DGF = 75^\circ$, F 为 BD 边的中点, 故: $FG = FD = BF = \frac{BE}{\cos 60^\circ} = 2L$

所以: $s = EF + FG = \sqrt{3}L + 2L$

(1分)

由: $s = vt$

(1分)

$$\text{解得: } t = \frac{(4\sqrt{3} + 6)L}{3c}$$

(1分)


(其他合理解法, 参照给分)

35. [化学选修3:物质结构与性质](15分)

3d




(2) 18 (2分) 对苯二甲酸分子间有氢键作用,而对二硝基苯分子间无氢键作用(2分)






(4) 2 (2分) 3.6 (2分)

36. [化学选修5:有机化学基础](15分)

(1) 环己酮 (2分) $[C_{14}H_{24}NO_2]^+Br^-$ 或 $C_{14}H_{24}NO_2Br$ (1分)



(3) 溴原子 (2分) 还原反应(或加成反应) (2分)



说明:

1. 本试卷中其它合理答案,可参照此评分标准酌情给分。

2. 方程式未写条件或条件不完全、不写“ \downarrow ”或“ \uparrow ”均扣一分,不配平不得分。

37. [生物选修1:生物技术实践](15分)

(1) 果胶(纤维素)(1分) 提高发酵后的酒精含量(2分) 加入过多蔗糖会使酵母菌失水死亡(2分)

(2) 提高果酒的品质,更好的抑制其他微生物的生长(2分) 可重复利用酵母菌,降低生产成本,提高果酒品质(2分)

(3) 发酵温度更高;需要通入无菌空气(2分) 将果醋样液接种在伊红美蓝培养基上,培养一段时间后观察是否出现黑色菌落(4分)

38. [生物选修3:现代生物科技专题](15分)

(1) 血清(2分) 特异性强,灵敏度高,可大量制备(3分)

(2) 两个或多个动物细胞结合形成一个细胞的过程(2分) 筛选出杂交瘤细胞(2分)
克隆化培养和抗体检测(2分)

(3) 作为诊断试剂检测新冠病毒;用于治疗新冠肺炎(4分)

关于我们

北京高考在线创办于 2014 年，隶属于北京太星网络科技有限公司，是北京地区极具影响力中学升学服务平台。主营业务涵盖：北京新高考、高中生涯规划、志愿填报、强基计划、综合评价招生和学科竞赛等。

北京高考在线旗下拥有网站门户、微信公众平台等全媒体矩阵生态平台。平台活跃用户 40W+，网站年度流量数千万量级。用户群体立足于北京，辐射全国 31 省市。

北京高考在线平台一直秉承“精益求精、专业严谨”的设计理念，不断探索“K12 教育+互联网+大数据”的运营模式，尝试基于大数据理论为广大中学和家长提供新鲜的高考资讯、专业的高考政策解读、科学的升学规划等，为广大高校、中学和教科研单位提供“衔接和桥梁纽带”作用。

平台自创办以来，为众多重点大学发现和推荐优秀生源，和北京近百所中学达成合作关系，累计举办线上线下升学公益讲座数百场，帮助数十万考生顺利通过考入理想大学，在家长、考生、中学和社会各界具有广泛的口碑影响力。

未来，北京高考在线平台将立足于北京新高考改革，基于对北京高考政策研究及北京高校资源优势，更好的服务全国高中家长和学生。



微信搜一搜

北京高考资讯

官方微博账号: bjgkzx

官方网站: www.gaokzx.com

咨询热线: 010-5751 5980

微信客服: gaokzx2018