2023 辽宁高考真题

化 学

本试卷满分 100 分，考试时间 75 分钟。

可能用到的相对原子质量：H-1 B-11 C-12 N-14 O-16 Na-23 S-32 Fe-56

一、选择题：本题共 15 小题，每小题 3 分，共 45 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

1. 科技是第一生产力，我国科学家在诸多领域取得新突破，下列说法错误的是

- A. 利用 CO_2 合成了脂肪酸：实现了无机小分子向有机高分子的转变
- B. 发现了月壤中的“嫦娥石 $[(\text{Ca}_5\text{Y})\text{Fe}(\text{PO}_4)_7]$ ”：其成分属于无机盐
- C. 研制了高效率钙钛矿太阳能电池，其能量转化形式：太阳能 $\rightarrow$ 电能
- D. 革新了海水原位电解制氢工艺：其关键材料多孔聚四氟乙烯耐腐蚀

2. 下列化学用语或表述正确的是

A. BeCl_2 的空间结构：V 形

B. P_4 中的共价键类型：非极性键

C. 基态 Ni 原子价电子排布式： $3d^{10}$

D. 顺-2-丁烯的结构简式：

3. 下列有关物质的工业制备反应错误的是

A. 合成氨： $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \xrightleftharpoons[\text{催化剂}]{\text{高温、高压}} 2\text{NH}_3$

B. 制 HCl ： $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{HCl}$

C. 制粗硅： $\text{SiO}_2 + 2\text{C} \xrightarrow{\text{高温}} \text{Si} + 2\text{CO}$

D. 冶炼镁： $2\text{MgO}(\text{熔融}) \xrightarrow{\text{电解}} 2\text{Mg} + \text{O}_2 \uparrow$

4. 下列鉴别或检验不能达到实验目的的是

- A. 用石灰水鉴别 Na_2CO_3 与 NaHCO_3
- B. 用 KSCN 溶液检验 FeSO_4 是否变质
- C. 用盐酸酸化的 BaCl_2 溶液检验 Na_2SO_3 是否被氧化
- D. 加热条件下用银氨溶液检验乙醇中是否混有乙醛

5. 我国古代四大发明之一黑火药的爆炸反应为： $\text{S} + 2\text{KNO}_3 + 3\text{C} = \text{K}_2\text{S} + \text{N}_2 \uparrow + 3\text{CO}_2 \uparrow$ 。设 N_A 为阿伏加德罗常数的值，下列说法正确的是

A. 11.2LCO_2 含 π 键数目为 N_A

B. 每生成 2.8gN_2 转移电子数目为 N_A

C. 0.1molKNO_3 晶体中含离子数目为 $0.2N_A$

D. $1\text{L}0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{K}_2\text{S}$ 溶液中含 S^{2-} 数目为 $0.1N_A$

6. 在光照下，螺吡喃发生开、闭环转换而变色，过程如下。下列关于开、闭环螺吡喃说法正确的是

- A. 均有手性
B. 互为同分异构体
C. N 原子杂化方式相同
D. 闭环螺吡喃亲水性更好

7. 某无隔膜流动海水电解法制 H_2 的装置如下图所示，其中高选择性催化剂 PRT 可抑制 O_2 产生。下列说法正确的是

- A. b 端电势高于 a 端电势
B. 理论上转移 2mole^- 生成 4gH_2
C. 电解后海水 pH 下降
D. 阳极发生: $\text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O} - 2\text{e}^- = \text{HClO} + \text{H}^+$

8. 冠醚因分子结构形如皇冠而得名，某冠醚分子 c 可识别 K^+ ，其合成方法如下。下列说法错误的是

- A. 该反应为取代反应
B. a、b 均可与 NaOH 溶液反应
C. c 核磁共振氢谱有 3 组峰
D. c 可增加 KI 在苯中的溶解度

9. 某种镁盐具有良好的电化学性能，其阴离子结构如下图所示。W、X、Y、Z、Q 是核电荷数依次增大的短周期元素，W、Y 原子序数之和等于 Z，Y 原子价电子数是 Q 原子价电子数的 2 倍。下列说法错误的是

- A. W 与 X 的化合物为极性分子
B. 第一电离能 $Z > Y > X$
C. Q 的氧化物是两性氧化物
D. 该阴离子中含有配位键

10. 某工厂采用如下工艺制备 $\text{Cr}(\text{OH})_3$ ，已知焙烧后 Cr 元素以 +6 价形式存在，下列说法错误的是

B	溶液颜色加深	发生了反应： $I_2 + I^- \rightleftharpoons I_3^-$
C	紫黑色晶体消失	$I_2(aq)$ 的消耗使溶解平衡 $I_2(s) \rightleftharpoons I_2(aq)$ 右移
D	溶液褪色	Zn 与有色物质发生了置换反应

A. A

B. B

C. C

D. D

14. 晶体结构的缺陷美与对称美同样受关注。某富锂超离子导体的晶胞是立方体(图 1)，进行镁离子取代及卤素共掺杂后，可获得高性能固体电解质材料(图 2)。下列说法错误的是

图1

图2

A. 图 1 晶体密度为 $\frac{72.5}{N_A \times a^3 \times 10^{-30}} \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$

B. 图 1 中 O 原子的配位数为 6

C. 图 2 表示的化学式为 $\text{LiMg}_2\text{OCl}_x\text{Br}_{1-x}$

D. Mg^{2+} 取代产生的空位有利于 Li^+ 传导

15. 某废水处理过程中始终保持 H_2S 饱和，即 $c(\text{H}_2\text{S}) = 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，通过调节 pH 使 Ni^{2+} 和 Cd^{2+} 形成硫化物而分离，体系中 pH 与 $-\lg c$ 关系如下图所示，c 为 HS^- 、 S^{2-} 、 Ni^{2+} 和 Cd^{2+} 的浓度，单位为 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。已知 $K_{sp}(\text{NiS}) > K_{sp}(\text{CdS})$ ，下列说法正确的是

A. $K_{sp}(\text{CdS}) = 10^{-18.4}$

B. ③为 pH 与 $-\lg c(\text{HS}^-)$ 的关系曲线

C. $K_{a1}(\text{H}_2\text{S}) = 10^{-8.1}$

D. $K_{a2}(\text{H}_2\text{S}) = 10^{-14.7}$

二、非选择题：本题共 4 小题，共 55 分。

16. 某工厂采用如下工艺处理镍钴矿硫酸浸取液含 (Ni^{2+} 、 Co^{2+} 、 Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 、 Mg^{2+} 和 Mn^{2+})。实现

镍、钴、镁元素的回收。

已知：

物质	$\text{Fe}(\text{OH})_3$	$\text{Co}(\text{OH})_2$	$\text{Ni}(\text{OH})_2$	$\text{Mg}(\text{OH})_2$
K_{sp}	$10^{-37.4}$	$10^{-14.7}$	$10^{-14.7}$	$10^{-10.8}$

回答下列问题：

- 用硫酸浸取镍钴矿时，提高浸取速率的方法为_____ (答出一条即可)。
- “氧化”中，混合气在金属离子的催化作用下产生具有强氧化性的过一硫酸(H_2SO_5)， $1\text{molH}_2\text{SO}_5$ 中过氧键的数目为_____。
- “氧化”中，用石灰乳调节 $\text{pH} = 4$ ， Mn^{2+} 被 H_2SO_5 氧化为 MnO_2 ，该反应的离子方程式为_____ (H_2SO_5 的电离第一步完全，第二步微弱)；滤渣的成分为 MnO_2 、_____ (填化学式)。
- “氧化”中保持空气通入速率不变， $\text{Mn}(\text{II})$ 氧化率与时间的关系如下。 SO_2 体积分数为_____ 时， $\text{Mn}(\text{II})$ 氧化速率最大；继续增大 SO_2 体积分数时， $\text{Mn}(\text{II})$ 氧化速率减小的原因是_____。

- “沉钴镍”中得到的 $\text{Co}(\text{II})$ 在空气中可被氧化成 $\text{CoO}(\text{OH})$ ，该反应的化学方程式为_____。
- “沉镁”中为使 Mg^{2+} 沉淀完全 (25°C)，需控制 pH 不低于_____ (精确至 0.1)。

17.2—噻吩乙醇 ($M_r = 128$) 是抗血栓药物氯吡格雷的重要中间体，其制备方法如下：

I. 制钠砂。向烧瓶中加入 300mL 液体 A 和 4.60g 金属钠，加热至钠熔化后，盖紧塞子，振荡至大量微小钠珠出现。

II. 制噻吩钠。降温至 10°C ，加入 25mL 噻吩，反应至钠砂消失。

III. 制噻吩乙醇钠。降温至 -10°C ，加入稍过量的环氧乙烷的四氢呋喃溶液，反应 30min。

IV. 水解。恢复室温，加入 70mL 水，搅拌 30min；加盐酸调 pH 至 4~6，继续反应 2h，分液；用水洗涤有机相，二次分液。

V. 分离。向有机相中加入无水 MgSO_4 ，静置，过滤，对滤液进行蒸馏，蒸出四氢呋喃、噻吩和液体 A 后，得到产品 17.92g。

回答下列问题：

(1) 步骤 I 中液体 A 可以选择_____。

a. 乙醇 b. 水 c. 甲苯 d. 液氨

(2) 噻吩沸点低于吡咯( )的原因是_____。

(3) 步骤 II 的化学方程式为_____。

(4) 步骤 III 中反应放热，为防止温度过高引发副反应，加入环氧乙烷溶液的方法是_____。

(5) 步骤 IV 中用盐酸调节 pH 的目的是_____。

(6) 下列仪器在步骤 V 中无需使用的是_____ (填名称)；无水 MgSO_4 的作用为_____。

(7) 产品的产率为_____ (用 Na 计算，精确至 0.1%)。

18. 硫酸工业在国民经济中占有重要地位。

(1) 我国古籍记载了硫酸的制备方法——“炼石胆($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)取精华法”。借助现代仪器分析，该制备过程中 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 分解的 TG 曲线(热重)及 DSC 曲线(反映体系热量变化情况，数值已省略)如下图所示。700 $^\circ\text{C}$ 左右有两个吸热峰，则此时分解生成的氧化物有 SO_2 、_____和_____ (填化学式)。

(2) 铅室法使用了大容积铅室制备硫酸(76%以下), 副产物为亚硝基硫酸, 主要反应如下:

(i) 上述过程中 NO_2 的作用为_____。

(ii) 为了适应化工生产的需求, 铅室法最终被接触法所代替, 其主要原因是_____ (答出两点即可)。

(3) 接触法制硫酸的关键反应为 SO_2 的催化氧化:

(i) 为寻求固定投料比下不同反应阶段的最佳生产温度, 绘制相应转化率(α)下反应速率(数值已略去)与温度的关系如下图所示, 下列说法正确的是_____。

- 温度越高, 反应速率越大
- $\alpha=0.88$ 的曲线代表平衡转化率
- α 越大, 反应速率最大值对应温度越低
- 可根据不同 α 下的最大速率, 选择最佳生产温度

(ii) 为提高钒催化剂的综合性能, 我国科学家对其进行了改良。不同催化剂下, 温度和转化率关系如下图所示, 催化性能最佳的是_____ (填标号)。

(iii) 设 O_2 的平衡分压为 p , SO_2 的平衡转化率为 α_e , 用含 p 和 α_e 的代数式表示上述催化氧化反应的

$K_p = \underline{\hspace{2cm}}$ (用平衡分压代替平衡浓度计算)。

19. 加兰他敏是一种天然生物碱，可作为阿尔茨海默症的药物，其中间体的合成路线如下。

已知：

回答下列问题：

- (1) A 中与卤代烃成醚活性高的羟基位于酯基的 _____ 位(填“间”或“对”)。
- (2) C 发生酸性水解，新产生的官能团为羟基和 _____ (填名称)。
- (3) 用 O_2 代替 PCC 完成 D→E 的转化，化学方程式为 _____。
- (4) F 的同分异构体中，红外光谱显示有酚羟基、无 N-H 键的共有 _____ 种。
- (5) H→I 的反应类型为 _____。
- (6) 某药物中间体的合成路线如下(部分反应条件已略去)，其中 M 和 N 的结构简式分别为 _____ 和 _____。

参考答案

一、选择题：本题共 15 小题，每小题 3 分，共 45 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

1. 【答案】A

【详解】A. 常见的脂肪酸有：硬脂酸($C_{17}H_{35}COOH$)、油酸($C_{17}H_{33}COOH$)，二者相对分子质量虽大，但没有达到高分子化合物的范畴，不属于有机高分子，A 错误；

B. 嫦娥石因其含有 Y、Ca、Fe 等元素，属于无机化合物，又因含有磷酸根，是无机盐，B 正确；

C. 电池是一种可以将其他能量转化为电能的装置，钙钛矿太阳能电池可以将太阳能转化为电能，C 正确；

D. 海水中含有大量的无机盐成分，可以将大多数物质腐蚀，而聚四氟乙烯塑料被称为塑料王，耐酸、耐碱，不会被含水腐蚀，D 正确；

故答案选 A。

2. 【答案】B

【详解】A. $BeCl_2$ 的中心原子为 Be，根据 VSEPR 模型可以计算， $BeCl_2$ 中不含有孤电子对，因此 $BeCl_2$ 为直线型分子，A 错误；

B. P_4 分子中相邻两 P 原子之间形成共价键，同种原子之间形成的共价键为非极性共价键， P_4 分子中的共价键类型为非极性共价键，B 正确；

C. Ni 原子的原子序数为 28，其基态原子的价电子排布为 $3d^84s^2$ ，C 错误；

D. 顺-2-丁烯的结构中两个甲基在双键的同一侧，其结构简式为 $\begin{matrix} H_3C & & CH_3 \\ & \backslash & / \\ & HC=CH & \end{matrix}$ ，D 错误；

故答案选 B。

3. 【答案】D

【详解】A. 工业合成氨是利用氮气和氢气在催化剂的条件下反应生成的，反应方程式为 $N_2+3H_2 \xrightleftharpoons[\text{催化剂}]{\text{高温、高压}} 2NH_3$ ，A 正确；

B. 工业制氯化氢是利用氢气和氯气反应生成的，反应方程式为 $H_2+Cl_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2HCl$ ，B 正确；

C. 工业制粗硅是将 SiO_2 与 C 在高温下反应生成粗硅，反应方程式为 $SiO_2+2C \xrightarrow{\text{高温}} Si+2CO$ ，C 正确；

D. 冶炼金属镁是电解熔融氯化镁，反应方程式为 $MgCl_2(\text{熔融}) \xrightarrow{\text{电解}} Mg+Cl_2\uparrow$ ，D 错误；

故答案选 D。

4. 【答案】A

【详解】A. 石灰水的主要成分为 $Ca(OH)_2$ 能与碳酸钠和碳酸氢钠反应生成碳酸钙，二者均生成白色沉淀，不能达到鉴别的目的，A 错误；

B. Fe^{2+} 变质后会生成 Fe^{3+} ，可以利用 KSCN 溶液鉴别，现象为溶液变成血红色，可以达到检验的目的，B 正确；

C. Na_2SO_3 被氧化后会变成 Na_2SO_4 ，加入盐酸酸化的 BaCl_2 后可以产生白色沉淀，可以用来检验 Na_2SO_3 是否被氧化，C 正确；

D. 含有醛基的物质可以与银氨溶液反应生成银单质，可以用来检验乙醇中混油的乙醛，D 正确；

故答案选 A。

5. 【答案】C

【详解】A. CO_2 分子含有 2 个 $\text{C}=\text{O}$ 键，题中没有说是标况条件下，气体摩尔体积未知，无法计算 $\text{C}=\text{O}$ 键个数，A 项错误；

B. 2.8g N_2 的物质的量 $n = \frac{m}{M} = \frac{2.8}{28} \text{mol} = 0.1\text{mol}$ ， 1mol N_2 生成转移的电子数为 $12 N_A$ ，则 0.1mol N_2 转移的电子数为 $1.2 N_A$ ，B 项错误；

C. 0.1mol KNO_3 晶体含有离子为 K^+ 、 NO_3^- ，含有离子数目为 $0.2 N_A$ ，C 项正确；

D. 因为 S^{2-} 水解使溶液中 S^{2-} 的数目小于 $0.1 N_A$ ，D 项错误；

答案选 C。

6. 【答案】B

【详解】A. 手性碳是连有四个不同的原子或原子团的碳原子，闭环螺吡喃含有一个手性碳原子

，因此具有手性，开环螺吡喃不含手性碳原子，不具备手性，故 A 错误；

B. 根据它们的结构简式，分子式均为 $\text{C}_{19}\text{H}_{19}\text{NO}$ ，它们结构不同，因此互为同分异构体，故 B 正确；

C. 闭环螺吡喃中 N 原子杂化方式为 sp^3 ，开环螺吡喃中 N 原子杂化方式为 sp^2 ，故 C 错误；

D. 开环螺吡喃中氧原子显负价，电子云密度大，容易与水分子形成分子间氢键，水溶性增大，因此开环螺吡喃亲水性更好，故 D 错误；

答案为 B。

7. 【答案】D

【分析】由图可知，左侧电极产生氧气，则左侧电极为阳极，电极 a 为正极，右侧电极为阴极，b 电极为负极，该装置的总反应产生氧气和氢气，相当于电解水，以此解题。

【详解】A. 由分析可知，a 为正极，b 电极为负极，则 a 端电势高于 b 端电势，A 错误；

B. 右侧电极上产生氢气的电极方程式为： $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- = \text{H}_2\uparrow$ ，则理论上转移 2mole^- 生成 2gH_2 ，B 错误；

C. 由图可知，该装置的总反应为电解海水的装置，随着电解的进行，海水的浓度增大，但是其 pH 基本不变，C 错误；

D. 由图可知，阳极上的电极反应为： $\text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O} - 2\text{e}^- = \text{HClO} + \text{H}^+$ ，D 正确；

故选 D。

8. 【答案】C

【详解】A. 根据 a 和 c 的结构简式可知, a 与 b 发生取代反应生成 c 和 HCl, A 正确;

B. a 中含有酚羟基, 酚羟基呈弱酸性能与 NaOH 反应, b 可在 NaOH 溶液中发生水解反应, 生成醇类, B 正确;

C. 根据 C 的结构简式可知, 冠醚中有四种不同化学环境的氢原子, 如图所示:

D. c 可与 K^+ 形成螯合离子 , 该物质在苯中溶解度较大, 因此 c 可增加 KI 在苯中

的溶解度, D 正确;

故答案选 C。

9. 【答案】A

【分析】W、X、Y、Z、Q 是核电荷数依次增大的短周期元素, W 形成 1 条单键且核电荷数最小, W 为 H, X 形成 4 条键, 核电荷数大于 H, 且小于其他三种元素, X 为 C, Y 形成 2 条单键, 核电荷数大于 C, Y 为 O, W、Y 原子序数之和等于 Z, Z 为 F, Y 原子价电子数为 Q 原子价电子数的 2 倍, Q 为 Al。

【详解】A. W 与 X 的化合物不一定为极性分子, 如 CH_4 就是非极性分子, A 错误;

B. 同周期元素从左到右第一电离能呈增大趋势, 则第一电离能 $F > O > C$, B 正确;

C. Q 为 Al, Al_2O_3 为两性氧化物, C 正确;

D. 该阴离子中 L 与 Q 之间形成配位键, D 正确;

故答案选 A。

10. 【答案】B

【分析】焙烧过程中铁、铬元素均被氧化, 同时转化为对应钠盐, 水浸时铁酸钠遇水水解生成氢氧化铁沉淀, 滤液中存在铬酸钠, 与淀粉的水解产物葡萄糖发生氧化还原得到氢氧化铬沉淀。

【详解】A. 铁、铬氧化物与碳酸钠和氧气反应时生成对应的钠盐和二氧化碳, A 正确;

B. 焙烧过程铁元素被氧化, 滤渣的主要成分为氧化铁, B 错误;

C. 滤液①中 Cr 元素的化合价是 +6 价, 铁酸钠遇水水解生成氢氧化铁沉淀溶液显碱性, 所以 Cr 元素主要存在形式为 CrO_4^{2-} , C 正确;

D. 由分析知淀粉水解液中的葡萄糖起还原作用, D 正确;

故选 B。

11. 【答案】B

【分析】该储能电池放电时，Pb 为负极，失电子结合硫酸根离子生成 PbSO₄，则多孔碳电极为正极，正极上 Fe³⁺得电子转化为 Fe²⁺，充电时，多孔碳电极为阳极，Fe²⁺失电子生成 Fe³⁺，PbSO₄ 电极为阴极，PbSO₄ 得电子生成 Pb 和硫酸。

- 【详解】A. 放电时负极上 Pb 失电子结合硫酸根离子生成 PbSO₄附着在负极上，负极质量增大，A 错误；
B. 储能过程中，该装置为电解池，将电能转化为化学能，B 正确；
C. 放电时，右侧为正极，电解质溶液中的阳离子向正极移动，左侧的 H⁺通过质子交换膜移向右侧，C 错误；
D. 充电时，总反应为 $\text{PbSO}_4 + 2\text{Fe}^{2+} = \text{Pb} + \text{SO}_4^{2-} + 2\text{Fe}^{3+}$ ，D 错误；

故答案选 B。

12. 【答案】C

【分析】开始一段时间（大约 13min 前）随着时间的推移 Mn(VII)浓度减小直至为 0，Mn(III)浓度增大直至达到最大值，结合图像，此时间段主要生成 Mn(III)，同时先生成少量 Mn(IV)后 Mn(IV)被消耗；后来（大约 13min 后）随着时间的推移 Mn(III)浓度减少，Mn(II)的浓度增大；据此作答。

- 【详解】A. 由图像可知，随着时间的推移 Mn(III)的浓度先增大后减小，说明开始反应生成 Mn(III)，后 Mn(III)被消耗生成 Mn(II)，Mn(III)能氧化 H₂C₂O₄，A 项错误；
B. 随着反应物浓度的减小，到大约 13min 时开始生成 Mn(II)，Mn(II)对反应起催化作用，13min 后反应速率会增大，B 项错误；
C. 由图像可知，Mn(VII)的浓度为 0 后才开始生成 Mn(II)，该条件下 Mn(II)和 Mn(VII)不能大量共存，C 项正确；
D. H₂C₂O₄ 为弱酸，在离子方程式中应以化学式保留，总反应为 $2\text{MnO}_4^- + 5\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + 6\text{H}^+ = 2\text{Mn}^{2+} + 10\text{CO}_2\uparrow + 8\text{H}_2\text{O}$ ，D 项错误；

答案选 C。

13. 【答案】D

- 【详解】A. 向 10mL 蒸馏水中加入 0.4gI₂，充分振荡，溶液呈浅棕色，说明 I₂ 的浓度较小，因为 I₂ 在水中溶解度较小，A 项正确；
B. 已知 I₃(aq)为棕色，加入 0.2g 锌粒后，Zn 与 I₂ 反应生成 ZnI₂，生成的 I⁻与 I₂ 发生反应 $\text{I}^- + \text{I}_2 \rightleftharpoons \text{I}_3^-$ ，生成 I₃⁻ 使溶液颜色加深，B 项正确；
C. I₂ 在水中存在溶解平衡 $\text{I}_2(\text{s}) \rightleftharpoons \text{I}_2(\text{aq})$ ，Zn 与 I₂ 反应生成的 I⁻与 I₂(aq)反应生成 I₃⁻，I₂(aq)浓度减小，上述溶解平衡向右移动，紫黑色晶体消失，C 项正确；
D. 最终溶液褪色是 Zn 与有色物质发生了化合反应，不是置换反应，D 项错误；

答案选 D。

14. 【答案】C

【详解】A. 根据均摊法，图 1 的晶胞中含 Li: $8 \times \frac{1}{4} + 1 = 3$ ，O: $2 \times \frac{1}{2} = 1$ ，Cl: $4 \times \frac{1}{4} = 1$ ，1 个晶胞的质量为

$$\frac{3 \times 7 + 16 + 35.5}{N_A} g = \frac{72.5}{N_A} g, \text{晶胞的体积为 } (a \times 10^{-10} \text{ cm})^3 = a^3 \times 10^{-30} \text{ cm}^3, \text{则晶体的密度为 } \frac{72.5}{N_A} g \div (a^3 \times 10^{-30} \text{ cm}^3) = \frac{72.5}{N_A \times a^3 \times 10^{-30}} \text{ g/cm}^3, \text{A项正确};$$

B. 图1晶胞中, O位于面心, 与O等距离最近的Li有6个, O原子的配位数为6, B项正确;

C. 根据均摊法, 图2中Li: 1, Mg或空位为 $8 \times \frac{1}{4} = 2$ 。O: $2 \times \frac{1}{2} = 1$, Cl或Br: $4 \times \frac{1}{4} = 1$, Mg的个数小于2,

根据正负化合价的代数和为0, 图2的化学式为 $\text{LiMgOCl}_x\text{Br}_{1-x}$, C项错误;

D. 进行镁离子取代及卤素共掺杂后, 可获得高性能固体电解质材料, 说明 Mg^{2+} 取代产生的空位有利于 Li^+ 的传导, D项正确;

答案选C。

15. 【答案】D

【分析】已知 H_2S 饱和溶液中随着 pH 的增大, H_2S 的浓度逐渐减小, HS^- 的浓度增大, S^{2-} 浓度逐渐增大, 则有 $-\lg c(\text{HS}^-)$ 和 $-\lg c(\text{S}^{2-})$ 随着 pH 增大而减小, 且相同 pH 相同时, HS^- 浓度大于 S^{2-} , 即 $-\lg c(\text{HS}^-)$ 小于 $-\lg c(\text{S}^{2-})$, 则 Ni^{2+} 和 Cd^{2+} 浓度逐渐减小, 且 $K_{\text{sp}}(\text{NiS}) > K_{\text{sp}}(\text{CdS})$, 即当 $c(\text{S}^{2-})$ 相同时, $c(\text{Ni}^{2+}) > c(\text{Cd}^{2+})$, 则 $-\lg c(\text{Ni}^{2+})$ 和 $-\lg c(\text{Cd}^{2+})$ 随着 pH 增大而增大, 且有 $-\lg c(\text{Ni}^{2+})$ 小于 $-\lg c(\text{Cd}^{2+})$, 由此可知曲线①代表 Cd^{2+} 、②代表 Ni^{2+} 、③代表 S^{2-} 、④代表 HS^- , 据此分析结合图像各点数据进行解题。

【详解】A. 由分析可知, 曲线①代表 Cd^{2+} 、③代表 S^{2-} , 由图示曲线①③交点可知, 此时

$$c(\text{Cd}^{2+}) = c(\text{S}^{2-}) = 10^{-13} \text{ mol/L}, \text{则有 } K_{\text{sp}}(\text{CdS}) = c(\text{Cd}^{2+}) \cdot c(\text{S}^{2-}) = 10^{-13} \text{ mol/L} \times 10^{-13} \text{ mol/L} = 10^{-26}, \text{A错误};$$

B. 由分析可知, ③为 pH 与 $-\lg c(\text{S}^{2-})$ 的关系曲线, B错误;

C. 由分析可知, 曲线④代表 HS^- , 由图示曲线④两点坐标可知, 此时 $c(\text{H}^+) = 10^{-1.6} \text{ mol/L}$ 时, $c(\text{HS}^-) = 10^{-6.5} \text{ mol/L}$,

$$K_{\text{a1}}(\text{H}_2\text{S}) = \frac{c(\text{H}^+) \cdot c(\text{HS}^-)}{c(\text{H}_2\text{S})} = \frac{10^{-1.6} \text{ mol/L} \times 10^{-6.5} \text{ mol/L}}{0.1 \text{ mol/L}} = 10^{-7.1} \text{ 或者当 } c(\text{H}^+) = 10^{-4.2} \text{ mol/L 时,}$$

$$c(\text{HS}^-) = 10^{-3.9} \text{ mol/L}, K_{\text{a1}}(\text{H}_2\text{S}) = \frac{c(\text{H}^+) \cdot c(\text{HS}^-)}{c(\text{H}_2\text{S})} = \frac{10^{-4.2} \text{ mol/L} \times 10^{-3.9} \text{ mol/L}}{0.1 \text{ mol/L}} = 10^{-7.1}, \text{C错误};$$

D. 已知 $K_{\text{a1}}K_{\text{a2}} = \frac{c(\text{H}^+)c(\text{HS}^-)}{c(\text{H}_2\text{S})} \cdot \frac{c(\text{H}^+)c(\text{S}^{2-})}{c(\text{HS}^-)} = \frac{c^2(\text{H}^+) \cdot c(\text{S}^{2-})}{c(\text{H}_2\text{S})}$, 由曲线③两点坐标可知, 当 $c(\text{H}^+) = 10^{-4.9} \text{ mol/L}$

时, $c(\text{S}^{2-}) = 10^{-13} \text{ mol/L}$, 或者当 $c(\text{H}^+) = 10^{-6.8} \text{ mol/L}$ 时, $c(\text{S}^{2-}) = 10^{-9.2} \text{ mol/L}$, 故有 $K_{\text{a1}}K_{\text{a2}} = \frac{c^2(\text{H}^+)c(\text{S}^{2-})}{c(\text{H}_2\text{S})} =$

$$\frac{(10^{-4.9} \text{ mol/L})^2 \times 10^{-13} \text{ mol/L}}{0.1 \text{ mol/L}} = \frac{(10^{-6.8} \text{ mol/L})^2 \times 10^{-9.2} \text{ mol/L}}{0.1 \text{ mol/L}} = 10^{-21.8}, \text{结合C项分析可知 } K_{\text{a1}} = 10^{-7.1}, \text{故有}$$

$$K_{\text{a2}}(\text{H}_2\text{S}) = 10^{-14.7}, \text{D正确};$$

故答案为D。

二、非选择题：本题共 4 小题，共 55 分。

16. 【答案】(1) 适当增大硫酸浓度或适当升高温度或将镍钴矿粉碎增大接触面积

(4) ①. 9.0% ②. SO_2 有还原性，过多将会降低 H_2SO_5 的浓度，降低 Mn (II) 氧化速率

(6) 11.1

【分析】在“氧化”中，混合气在金属离子的催化作用下产生具有强氧化性的过一硫酸(H_2SO_5)，用石灰乳调节 $pH = 4$ ， Mn^{2+} 被 H_2SO_5 氧化为 MnO_2 ，发生反应 $H_2O + Mn^{2+} + HSO_5^- = MnO_2 + SO_4^{2-} + 3H^+$ ， Fe^{3+} 水解同时生成氢氧化铁，“沉钴镍”过程中， Co^{2+} 变为 $Co(OH)_2$ ，在空气中可被氧化成 $CoO(OH)$ 。

【小问 1 详解】

用硫酸浸取镍钴矿时，为提高浸取速率可适当增大硫酸浓度、升高温度或将镍钴矿粉碎增大接触面积

【小问 2 详解】

(H_2SO_5) 的结构简式为 $O = \overset{\overset{O}{||}}{S} - O - O - H$ ，所以 $1mol H_2SO_5$ 中过氧键的数目为 N_A

【小问 3 详解】

用石灰乳调节 $pH = 4$ ， Mn^{2+} 被 H_2SO_5 氧化为 MnO_2 ，该反应的离子方程式为：

$H_2O + Mn^{2+} + HSO_5^- = MnO_2 + SO_4^{2-} + 3H^+$ ；氢氧化铁的 $K_{sp} = 10^{-37.4}$ ，当铁离子完全沉淀时，溶液中 $c(Fe^{3+}) = 10^{-5} mol/L$ ， $K_{sp} = c(OH^-)^3 \times c(Fe^{3+}) = c(OH^-)^3 \times 10^{-5} = 10^{-37.4}$ ， $c(OH^-) = 10^{-10.8} mol/L$ ，根据 $K_w = 10^{-14}$ ， $pH = 3.2$ ，此时溶液的 $pH = 4$ ，则铁离子完全水解，生成氢氧化铁沉淀，故滤渣还有氢氧化铁；

【小问 4 详解】

根据图示可知 SO_2 体积分数为 0.9% 时，Mn (II) 氧化速率最大；继续增大 SO_2 体积分数时，由于 SO_2 有还原性，过多将会降低 H_2SO_5 的浓度，降低 Mn (II) 氧化速率

【小问 5 详解】

“沉钴镍”中得到的 $Co(OH)_2$ ，在空气中可被氧化成 $CoO(OH)$ ，该反应的化学方程式为：

【小问 6 详解】

氢氧化镁的 $K_{sp} = 10^{-10.8}$ ，当镁离子完全沉淀时， $c(Mg^{2+}) = 10^{-5} mol/L$ ，根据 K_{sp} 可计算 $c(OH^-) = 10^{-2.9} mol/L$ ，根据 $K_w = 10^{-14}$ ， $c(H^+) = 10^{-11.1} mol/L$ ，所以溶液的 $pH = 11.1$ ；

17. 【答案】(1) c (2) 中含有 N 原子，可以形成分子间氢键，氢键可以使熔沸点升高

(4) 将环氧乙烷溶液沿烧杯壁缓缓加入，此过程中不断用玻璃棒进行搅拌来散热

(5) 将 NaOH 中和，使平衡正向移动，增大反应物的转化率

(6) ①. 球形冷凝管和分液漏斗 ②. 除去水

(7) 70.0%

【小问 1 详解】

步骤 I 制钠砂过程中，液体 A 不能和 Na 反应，而乙醇、水和液氨都能和金属 Na 反应，故选 c。

【小问 2 详解】

噻吩沸点低于吡咯( )的原因是： 中含有 N 原子，可以形成分子间氢键，氢键可以使熔沸点升高。

【小问 3 详解】

步骤 II 中 和 Na 反应生成 2-噻吩钠和 H₂，化学方程式为：

【小问 4 详解】

步骤 III 中反应放热，为防止温度过高引发副反应，加入环氧乙烷溶液的方法是：将环氧乙烷溶液沿烧杯壁缓缓加入，此过程中不断用玻璃棒进行搅拌来散热。

【小问 5 详解】

2-噻吩乙醇钠水解生成 2-噻吩乙醇的过程中有 NaOH 生成，用盐酸调节 pH 的目的是将 NaOH 中和，使平衡正向移动，增大反应物的转化率。

【小问 6 详解】

步骤 V 中的操作有过滤、蒸馏，蒸馏的过程中需要直形冷凝管不能用球形冷凝管，无需使用的是球形冷凝管和分液漏斗；向有机相中加入无水 MgSO₄ 的作用是：除去水。

【小问 7 详解】

步骤 I 中向烧瓶中加入 300mL 液体 A 和 4.60g 金属钠，Na 的物质的量为 $\frac{4.60\text{g}}{23\text{g/mol}}=0.2\text{mol}$ ，步骤 II 中

Na 完全反应，根据方程式可知，理论上可以生成 0.2mol 2-噻吩乙醇，产品的产率为

$$\frac{17.92\text{g}}{0.2\text{mol} \times 128\text{g/mol}} \times 100\% = 70.0\%$$

18. **【答案】**(1) ①. CuO ②. SO₃

(2) ①. 催化剂 ②. 反应中有污染空气的 NO 和 NO₂ 放出影响空气环境、NO₂ 可以溶解在硫酸中给产物

硫酸带来杂质、产率不高（答案合理即可）

$$(3) \quad \textcircled{1}. cd \quad \textcircled{2}. d \quad \textcircled{3}. \frac{\alpha_e}{(1-\alpha_e) \cdot p^{\frac{1}{2}}}$$

【小问 1 详解】

根据图示的热重曲线所示，在 700°C 左右会出现两个吸热峰，说明此时 CuSO_4 发生热分解反应，从 TG 图像可以看出，质量减少量为原 CuSO_4 质量的一半，说明有固体 CuO 剩余，还有其他气体产出，此时气体产物为 SO_2 、 SO_3 、 O_2 ，可能出现的化学方程式为 $3\text{CuSO}_4 \xrightarrow{700^\circ\text{C}} 3\text{CuO} + 2\text{SO}_2\uparrow + \text{SO}_3\uparrow + \text{O}_2\uparrow$ ，结合反应中产物的

固体产物质量和气体产物质量可以确定，该反应的产物为 CuO 、 SO_2 、 SO_3 、 O_2 ，故答案为 CuO 、 SO_3 。

【小问 2 详解】

(i) 根据所给的反应方程式， NO_2 在反应过程中消耗再生成，说明 NO_2 在反应中起催化剂的作用；

(ii) 近年来，铅室法被接触法代替因为在反应中有污染空气的 NO 和 NO_2 放出影响空气环境、同时作为催化剂的 NO_2 可以溶解在硫酸中给产物硫酸带来杂质影响产品质量、产率不高（答案合理即可）。

【小问 3 详解】

(i) a. 根据不同转化率下的反应速率曲线可以看出，随着温度的升高反应速率先加快后减慢，a 错误；

b. 从图中所给出的速率曲线可以看出，相同温度下，转化率越低反应速率越快，但在转化率小于 88% 的时的反应速率图像并没有给出，无法判断 $\alpha=0.88$ 的条件下是平衡转化率，b 错误；

c. 从图像可以看出随着转化率的增大，最大反应速率不断减小，最大反应速率出现的温度也逐渐降低，c 正确；

d. 从图像可以看出随着转化率的增大，最大反应速率出现的温度也逐渐降低，这时可以根据不同转化率选择合适的反应温度以减少能源的消耗，d 正确；

故答案选 cd；

(ii) 为了提高催化剂的综合性能，科学家对催化剂进行了改良，从图中可以看出标号为 d 的催化剂 V-K-Cs-Ce 对 SO_2 的转化率最好，产率最佳，故答案选 d；

(iii) 利用分压代替浓度计算平衡常数，反应的平衡常数 $K_p = \frac{p(\text{SO}_3)}{p(\text{SO}_2) p^{\frac{1}{2}}(\text{O}_2)} = \frac{\frac{n(\text{SO}_3)}{n(\text{总})} p(\text{总})}{\frac{n(\text{SO}_2)}{n(\text{总})} p(\text{总}) \cdot p^{\frac{1}{2}}(\text{O}_2)}$

$\frac{n(\text{SO}_3)}{n(\text{SO}_2) \cdot p^{\frac{1}{2}}(\text{O}_2)}$ ；设 SO_2 初始量为 m mol，则平衡时 $n(\text{SO}_2) = m - m \cdot \alpha_e = m(1 - \alpha_e)$ ， $n(\text{SO}_3) = m \cdot \alpha_e$ ， $K_p =$

$$\frac{m \cdot \alpha_e}{m(1 - \alpha_e) \cdot p^{\frac{1}{2}}(\text{O}_2)} = \frac{\alpha_e}{(1 - \alpha_e) \cdot p^{\frac{1}{2}}}$$
，故答案为 $\frac{\alpha_e}{(1 - \alpha_e) \cdot p^{\frac{1}{2}}}$ 。

19. 【答案】(1) 对 (2) 羧基

(4) 3 (5) 取代

【分析】根据有机物 A 的结构和有机物 C 的结构，有机物 A 与 CH_3I 反应生成有机物 B，根据有机物 B 的

发生还原反应生成有机物 D，有机物 D 与 PCC 发生氧化反应生成有机物 E，根据有机物 E 的结构和有机物

件给的②反应生成有机物 G，有机物 G 发生还原反应生成有机物 H，根据有机物 H 与有机物 G 的分子式可

【小问 1 详解】

由有机物 A 与 CH_3I 反应得到有机物 B 可知，酚与卤代烃反应成醚时，优先与其含有的其他官能团的对位羟基发生反应，即酯基对位的酚羟基活性最高，可以发生成醚反应，故答案为：对位。

【小问 2 详解】

有机物 C 在酸性条件下发生水解，其含有的酯基发生水解生成羧基，其含有的醚键发生水解生成酚羟基，故答案为羧基。

【小问 3 详解】

O₂ 与有机物 D 发生催化氧化反应生成有机物 E，反应的化学方程式为 2

【小问 4 详解】

F 的同分异构体中不含有 N-H 键，说明结构中含有 $\begin{matrix} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{N} \\ | \\ \text{CH}_3 \end{matrix}$ 结构，又因红外中含有酚羟基，说明结构中含有

有苯环和羟基，固定羟基的位置， $\begin{matrix} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{N} \\ | \\ \text{CH}_3 \end{matrix}$ 有邻、间、对三种情况，故有 3 种同分异构体。

【小问 5 详解】

有机物 H 与 $\text{HCOOCH}_2\text{CH}_3$ 反应生成有机物 I，反应时，有机物 H 中的 N-H 键发生断裂，与 $\text{HCOOCH}_2\text{CH}_3$ 中断裂的醛基结合，故反应类型为取代反应。

【小问 6 详解】

根据题目中给的反应条件和已知条件，利用逆合成法分析，有机物 N 可以与 NaBH_4 反应生成最终产物，类似于题中有机物 G 与 NaBH_4 反应生成有机物 H，作用位置为有机物 N 的 N=C 上，故有机物 N 的结构为

，有机物 M 可以发生已知条件所给的反应生成有机物 N，说明有机物 M 中含有 C=O，

结合反应原料中含有羟基，说明原料发生反应生成有机物 M 的反应是羟基的催化氧化，有机物 M 的结构

关于我们

北京高考在线创办于 2014 年，隶属于北京太星网络科技有限公司，是北京地区极具影响力的中学升学服务平台。主营业务涵盖：北京新高考、高中生涯规划、志愿填报、强基计划、综合评价招生和学科竞赛等。

北京高考在线旗下拥有网站门户、微信公众平台等全媒体矩阵生态平台。平台活跃用户 40W+，网站年度流量数千万量级。用户群体立足于北京，辐射全国 31 省市。

北京高考在线平台一直秉承 “精益求精、专业严谨” 的建设理念，不断探索 “K12 教育+互联网+大数据” 的运营模式，尝试基于大数据理论为广大中学和家长提供新鲜的高考资讯、专业的高考政策解读、科学的升学规划等，为广大高校、中学和教科研单位提供 “衔接和桥梁纽带” 作用。

平台自创办以来，为众多重点大学发现和推荐优秀生源，和北京近百所中学达成合作关系，累计举办线上线下升学公益讲座数百场，帮助数十万考生顺利通过考入理想大学，在家长、考生、中学和社会各界具有广泛的口碑影响力

未来，北京高考在线平台将立足于北京新高考改革，基于对北京高考政策研究及北京高校资源优势，更好的服务全国高中家长和学生。