

6. 赵爽弦图（如图1）中的大正方形是由4个全等的直角三角形和中间的小正方形拼接而成的，若直角三角形的两条直角边长为 a, b ，斜边长为 c ，由大正方形面积等于4个直角三角形的面积与中间小正方形的面积之和可得勾股定理 $a^2 + b^2 = c^2$ 。仿照赵爽弦图构造如图2所示的菱形，它是由两对全等的直角三角形和中间的矩形拼接而成的，设直角三角形的斜边都为1，其中一对直角三角形含有锐角 α ，另一对直角三角形含有锐角 β （位置如图2所示），借鉴勾股定理的推导思路可以得到结论
- A. $\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$ B. $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$
 C. $\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$ D. $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$




图1




图2

7. 已知抛物线 $E: y = 4x$ ，圆 $F: (x-1)^2 + y^2 = 4$ ，直线 $l: y = t$ (t 为实数)与抛物线 E 交于点 A ，与圆 F 交于 B, C 两点，且点 B 位于点 C 的右侧，则 $\triangle FAB$ 的周长可能为
- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
8. 存在函数 $f(x)$ 使得对于 $\forall x \in \mathbf{R}$ 都有 $f(g(x)) = |x|$ ，则函数 $g(x)$ 可能为
- A. $g(x) = \sin x$ B. $g(x) = x^2 + 2x$
 C. $g(x) = x^3 - x$ D. $g(x) = e^x + e^{-x}$

二、选择题：本题共4小题，每小题5分，共20分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得5分，部分选对的得2分，有选错的得0分。

9. 已知复数 z 的共轭复数是 \bar{z} ， $(1-i)z = 1+i$ ， i 是虚数单位，则下列结论正确的是
- A. $z^{2022} = 1$
 B. $z + \bar{z}$ 的虚部是0
 C. $\sqrt{z} \cdot z + 2z = \sqrt{5}$
 D. $z \cdot \bar{z} + 2z$ 在复平面内对应的点在第四象限

10. 吹气球时，记气球的半径 r 与体积 V 之间的函数关系为 $r(V)$ ， $r'(V)$ 为 $r(V)$ 的导函数。已知 $r(V)$ 在 $0 \leq V \leq 3$ 上的图象如图3所示，若 $0 \leq V_1 < V_2 \leq 3$ ，则下列结论正确的是




图3


A. $\frac{r(1) - r(0)}{1 - 0} < \frac{r(2) - r(1)}{2 - 1}$

B. $r'(1) > r'(2)$


C. $r\left(\frac{V_1 + V_2}{2}\right) < \frac{r(V_1) + r(V_2)}{2}$

D. 存在 $V_0 \in (V_1, V_2)$ ，使得 $r'(V_0) = \frac{r(V_2) - r(V_1)}{V_2 - V_1}$


11. 在所有棱长都相等的正三棱柱中，点 A 是三棱柱的顶点， M, N, Q 是所在棱的中点，则下列选项中直线 AQ 与直线 MN 垂直的是




A



B



C



D

12. 如图4，已知扇形 OAB 的半径为1， $\angle AOB = \frac{\pi}{2}$ ，点 C, D 分别为线段 OA, OB 上的动点，且 $CD = 1$ ，点 E 为 \widehat{AB} 上的任意一点，则下列结论正确的是




图4

- A. $\vec{OE} \cdot \vec{AB}$ 的最小值为0
 C. $\vec{EC} \cdot \vec{ED}$ 的最大值为1

- B. $\vec{EA} \cdot \vec{EB}$ 的最小值为 $1 - \sqrt{2}$
 D. $\vec{EC} \cdot \vec{ED}$ 的最小值为0

三、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。

13. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的渐近线方程为 $y = \pm\sqrt{3}x$ ，则 C 的离心率为_____。

14. 若直线 $y = x + a$ 和直线 $y = x + b$ 将圆 $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 1$ 的周长四等分，则

$|a - b| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

15. 若函数 $f(x) = \sin x \cdot \cos(x + \varphi)$ 的最大值为1，则常数 φ 的一个取值为_____。

16. 十字贯穿体（如图5）是美术素描学习中一种常见的教具。如图6，该十字贯穿体由两个全等的正四棱柱组合而成，且两个正四棱柱的侧棱互相垂直，若底面正方形边长为2，则这两个正四棱柱公共部分所构成的几何体的内切球的体积为




图5




图6

四、解答题：本题共6小题，共70分。解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤。

17. (10分)

已知递增等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ，且满足 $4a_1 = a_2 a_3$ ， $S_3 = 14$ 。

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式。

(2) 若数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n = \begin{cases} a_n, & n = 3k, \\ k, & 3(k-1) < n < 3k \end{cases} (k \in \mathbb{N}^+)$ ，求数列 $\{b_n\}$ 的前15项和。

18. (12分)

小李下班后驾车回家的路线有两条。路线1经过三个红绿灯路口，每个路口遇到红灯的概率都是 $\frac{1}{3}$ ；路线2经过两个红绿灯路口，第一个路口遇到红灯的概率是 $\frac{1}{2}$ 。

第二个路口遇到红灯的概率是 $\frac{2}{3}$ 。假设两条路线全程绿灯时的驾车回家时长相同，且每个红绿灯路口是否遇到红灯相互独立。

(1) 若小李下班后选择路线1驾车回家，求至少遇到一个红灯的概率。

(2) 假设每遇到一个红灯驾车回家时长就会增加1 min，为使小李下班后驾车回家时长的累计增加时间（单位：min）的期望最小，小李应选择哪条路线？请说明理由。

19. (12分)

如图7, 已知 $\triangle ABC$ 内有一点 P , 满足 $\angle PAB = \angle PBC = \angle PCA = \alpha$.

(1) 证明: $PB \sin \angle ABC = AB \sin \alpha$.

(2) 若 $\angle ABC = 90^\circ$, $AB = BC = 1$, 求 PC .




图7

20. (12分)

如图8, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, DE 是 $\triangle ABC$ 的中位线, 沿 DE 将 $\triangle ADE$ 进行翻折, 使得 $\triangle ACE$ 是等边三角形(如图9), 记 AB 的中点为 F .

(1) 证明: $DF \perp$ 平面 ABC .

(2) 若 $AE = 2$, 二面角 $D-AC-E$ 为 $\frac{\pi}{6}$, 求直线 AB 与平面 ACD 所成角的正弦值.




图8




图9

21. (12分)

已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 点 $F(1, 0)$ 为椭圆的右焦点, 过点 F 且斜率不为 0 的直线 l_1 交椭圆于 M, N 两点, 当 l_1 与 x 轴垂直时, $|MN| = 3$.

(1) 求椭圆 C 的标准方程.

(2) A_1, A_2 分别为椭圆的左、右顶点, 直线 A_1M, A_2N 分别与直线 $l_2: x = 1$ 交于 P, Q 两点, 证明: 四边形 OPA_2Q 为菱形.

22. (12分)

已知函数 $f(x) = xe^{nx} - nx (n \in \mathbf{N}^* \text{ 且 } n \geq 2)$ 的图象与 x 轴交于 P, Q 两点, 且点 P 在点 Q 的左侧.

(1) 求点 P 处的切线方程 $y = g(x)$, 并证明: $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq g(x)$.

(2) 若关于 x 的方程 $f(x) = t (t \text{ 为实数})$ 有两个正实根 x_1, x_2 , 证明: $|x_2 - x_1| < \frac{2t}{n \ln n} + \frac{\ln n}{n}$.

关于我们

北京高考在线创办于 2014 年，隶属于北京太星网络科技有限公司，是北京地区极具影响力的中学升学服务平台。主营业务涵盖：北京新高考、高中生涯规划、志愿填报、强基计划、综合评价招生和学科竞赛等。

北京高考在线旗下拥有网站门户、微信公众平台等全媒体矩阵生态平台。平台活跃用户 40W+，网站年度流量数千万量级。用户群体立足于北京，辐射全国 31 省市。

北京高考在线平台一直秉承 “精益求精、专业严谨” 的建设理念，不断探索 “K12 教育+互联网+大数据” 的运营模式，尝试基于大数据理论为广大中学和家长提供新鲜的高考资讯、专业的高考政策解读、科学的升学规划等，为广大高校、中学和教科研单位提供 “衔接和桥梁纽带” 作用。

平台自创办以来，为众多重点大学发现和推荐优秀生源，和北京近百所中学达成合作关系，累计举办线上线下升学公益讲座数百场，帮助数十万考生顺利通过考入理想大学，在家长、考生、中学和社会各界具有广泛的口碑影响力

未来，北京高考在线平台将立足于北京新高考改革，基于对北京高考政策研究及北京高校资源优势，更好的服务全国高中家长和学生。



微信搜一搜

北京高考资讯