

数 学

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 若集合 $M = \{x | \sqrt{x} < 4\}$ ， $N = \{x | 3x \geq 1\}$ ，则 $M \cap N =$

A. $\{x | 0 \leq x < 2\}$

B. $\{x | \frac{1}{3} \leq x < 2\}$

C. $\{x | 3 \leq x < 16\}$

D. $\{x | \frac{1}{3} \leq x < 16\}$

2. 若 $i(1-z) = 1$ ，则 $z + \bar{z} =$

A. -2

B. -1

C. 1

D. 2

3. 在 $\triangle ABC$ 中，点 D 在边 AB 上， $BD = 2DA$ 。记 $\overrightarrow{CA} = \mathbf{m}$ ， $\overrightarrow{CD} = \mathbf{n}$ ，则 $\overrightarrow{CB} =$

A. $3\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$

B. $-2\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$

C. $3\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$

D. $2\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$

4. 南水北调工程缓解了北方一些地区水资源短缺问题，其中一部分水蓄入某水库。已知该水库水位为海拔 148.5 m 时，相应水面的面积为 140.0 km²；水位为海拔 157.5 m 时，相应水面的面积为 180.0 km²。将该水库在这两个水位间的形状看作一个棱台，则该水库水位从海拔 148.5 m 上升到 157.5 m 时，增加的水量约为 ($\sqrt{7} \approx 2.65$)

A. $1.0 \times 10^9 \text{ m}^3$

B. $1.2 \times 10^9 \text{ m}^3$

C. $1.4 \times 10^9 \text{ m}^3$

D. $1.6 \times 10^9 \text{ m}^3$

5. 从 2 至 8 的 7 个整数中随机取 2 个不同的数，则这 2 个数互质的概率为

A. $\frac{1}{6}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{2}{3}$

6. 记函数 $f(x) = \sin(\omega x + \frac{\pi}{4}) + b$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 T . 若 $\frac{2\pi}{3} < T < \pi$, 且 $y = f(x)$

的图像关于点 $(\frac{3\pi}{2}, 2)$ 中心对称, 则 $f(\frac{\pi}{2}) =$

- A. 1 B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{5}{2}$ D. 3

7. 设 $a = 0.1e^{0.1}$, $b = \frac{1}{9}$, $c = -\ln 0.9$, 则

- A. $a < b < c$ B. $c < b < a$ C. $c < a < b$ D. $a < c < b$

8. 已知正四棱锥的侧棱长为 l , 其各顶点都在同一球面上. 若该球的体积为 36π , 且 $3 \leq l \leq 3\sqrt{3}$, 则该正四棱锥体积的取值范围是

- A. $[18, \frac{81}{4}]$ B. $[\frac{27}{4}, \frac{81}{4}]$ C. $[\frac{27}{4}, \frac{64}{3}]$ D. $[18, 27]$

二、选择题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分. 在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求. 全部选对的得 5 分, 部分选对的得 2 分, 有选错的得 0 分.

9. 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$, 则

- A. 直线 BC_1 与 DA_1 所成的角为 90°
 B. 直线 BC_1 与 CA_1 所成的角为 90°
 C. 直线 BC_1 与平面 BB_1D_1D 所成的角为 45°
 D. 直线 BC_1 与平面 $ABCD$ 所成的角为 45°

10. 已知函数 $f(x) = x^3 - x + 1$, 则

- A. $f(x)$ 有两个极值点 B. $f(x)$ 有三个零点
 C. 点 $(0, 1)$ 是曲线 $y = f(x)$ 的对称中心 D. 直线 $y = 2x$ 是曲线 $y = f(x)$ 的切线

11. 已知 O 为坐标原点, 点 $A(1, 1)$ 在抛物线 $C: x^2 = 2py$ ($p > 0$) 上, 过点 $B(0, -1)$ 的直线交 C 于 P, Q 两点, 则

- A. C 的准线为 $y = -1$ B. 直线 AB 与 C 相切
 C. $|OP| \cdot |OQ| > |OA|^2$ D. $|BP| \cdot |BQ| > |BA|^2$

12. 已知函数 $f(x)$ 及其导函数 $f'(x)$ 的定义域均为 \mathbf{R} , 记 $g(x) = f'(x)$. 若 $f(\frac{3}{2} - 2x)$, $g(2+x)$ 均为偶函数, 则

- A. $f(0) = 0$ B. $g(\frac{1}{2}) = 0$ C. $f(-1) = f(4)$ D. $g(-1) = g(2)$

三、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。

13. $(1 - \frac{y}{x})(x+y)^8$ 的展开式中 x^2y^6 的系数为_____ (用数字作答)。

14. 写出与圆 $x^2 + y^2 = 1$ 和 $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 16$ 都相切的一条直线的方程_____。

15. 若曲线 $y = (x+a)e^x$ 有两条过坐标原点的切线，则 a 的取值范围是_____。

16. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ ， C 的上顶点为 A ，两个焦点为 F_1, F_2 ，离心率为 $\frac{1}{2}$ 。过 F_1 且垂直于 AF_2 的直线与 C 交于 D, E 两点， $|DE| = 6$ ，则 $\triangle ADE$ 的周长是_____。

四、解答题：本题共6小题，共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (10分)

记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $a_1 = 1$ ， $\{\frac{S_n}{a_n}\}$ 是公差为 $\frac{1}{3}$ 的等差数列。

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(2) 证明： $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n} < 2$ 。

18. (12分)

记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，已知 $\frac{\cos A}{1 + \sin A} = \frac{\sin 2B}{1 + \cos 2B}$ 。

(1) 若 $C = \frac{2\pi}{3}$ ，求 B ；


(2) 求 $\frac{a^2 + b^2}{c^2}$ 的最小值。

19. (12分)

如图，直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的体积为4， $\triangle A_1BC$ 的面积为 $2\sqrt{2}$ 。

(1) 求 A 到平面 A_1BC 的距离；

(2) 设 D 为 A_1C 的中点， $AA_1 = AB$ ，平面 $A_1BC \perp$ 平面



ABB_1A_1 ，求二面角 $A - BD - C$ 的正弦值。

关注北京高考在线官方微信：北京高考资讯(微信号:bjgkzx)，获取更多试题资料及排名分析信息。

20. (12分)

一医疗团队为研究某地的一种地方性疾病与当地居民的卫生习惯（卫生习惯分为良好和不够良好两类）的关系，在已患该疾病的病例中随机调查了100例（称为病例组），同时在未患该疾病的人群中随机调查了100人（称为对照组），得到如下数据：

	不够良好	良好
病例组	40	60
对照组	10	90

(1) 能否有99%的把握认为患该疾病群体与未患该疾病群体的卫生习惯有差异？

(2) 从该地的人群中任选一人， A 表示事件“选到的人卫生习惯不够良好”， B 表示事件“选到的人患有该疾病”， $\frac{P(B|A)}{P(\bar{B}|A)}$ 与 $\frac{P(B|\bar{A})}{P(\bar{B}|\bar{A})}$ 的比值是卫生习惯不够良好对患该疾病风险程度的一项度量指标，记该指标为 R 。

(i) 证明： $R = \frac{P(A|B)}{P(\bar{A}|B)} \cdot \frac{P(\bar{A}|\bar{B})}{P(A|\bar{B})}$ ；

(ii) 利用该调查数据，给出 $P(A|B)$ ， $P(A|\bar{B})$ 的估计值，并利用(i)的结果给出 R 的估计值。

附： $K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$ ，

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

21. (12分)

已知点 $A(2,1)$ 在双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{a^2-1} = 1 (a > 1)$ 上，直线 l 交 C 于 P ， Q 两点，直线 AP ， AQ 的斜率之和为0。

(1) 求 l 的斜率；

(2) 若 $\tan \angle PAQ = 2\sqrt{2}$ ，求 $\triangle PAQ$ 的面积。

22. (12分)

已知函数 $f(x) = e^x - ax$ 和 $g(x) = ax - \ln x$ 有相同的最小值。

(1) 求 a ；

(2) 证明：存在直线 $y = b$ ，其与两条曲线 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 共有三个不同的交点，并且从左到右的三个交点的横坐标成等差数列。

关于我们

北京高考在线创办于 2014 年，隶属于北京太星网络科技有限公司，是北京地区极具影响力的中学升学服务平台。主营业务涵盖：北京新高考、高中生涯规划、志愿填报、强基计划、综合评价招生和学科竞赛等。

北京高考在线旗下拥有网站门户、微信公众平台等全媒体矩阵生态平台。平台活跃用户 40W+，网站年度流量数千万量级。用户群体立足于北京，辐射全国 31 省市。

北京高考在线平台一直秉承“精益求精、专业严谨”的建设理念，不断探索“K12 教育+互联网+大数据”的运营模式，尝试基于大数据理论为广大中学和家长提供新鲜的高考资讯、专业的高考政策解读、科学的升学规划等，为广大高校、中学和教科研单位提供“衔接和桥梁纽带”作用。

平台自创办以来，为众多重点大学发现和推荐优秀生源，和北京近百所中学达成合作关系，累计举办线上线下升学公益讲座数百场，帮助数十万考生顺利通过考入理想大学，在家长、考生、中学和社会各界具有广泛的口碑影响力

未来，北京高考在线平台将立足于北京新高考改革，基于对北京高考政策研究及北京高校资源优势，更好的服务全国高中家长和学生。



微信搜一搜

北京高考资讯