

★启用前注意保密

## 2022年普通高等学校招生全国统一考试模拟测试(一)

### 数学参考答案

评分标准:

1. 本解答给出了一种或几种解法供参考, 如果考生的解法与本解答不同, 可根据试题的主要考查内容比照评分标准制订相应的评分细则。
2. 对计算题, 当考生的解答在某一步出现错误时, 如果后继部分的解答未改变该题的内容和难度, 可视影响的程度决定后继部分的给分, 但不得超过该部分正确解答应得分数的一半; 如果后继部分的解答有较严重的错误, 就不再给分。
3. 解答右端所注分数, 表示考生正确做到这一步应得的累加分数。

一、选择题: 本题共8小题, 每小题5分, 共40分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	D	B	C	D	A	D	B	B

二、选择题: 本题共4小题, 每小题5分, 共20分。在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求。(全部选对的得5分, 部分选对的得2分, 有选错的得0分)

题号	9	10	11	12
答案	BD	ACD	AD	BC

三、填空题: 本题共4小题, 每小题5分, 共20分。

13. 60

14.  $AE$  和  $GF$  ( $AE$  和  $DG$ ,  $AE$  和  $DF$ ,  $AG$  和  $DF$ ) (写出其中一对即可)

15.  $(4\sqrt{5}, 2\sqrt{5})$

16.  $\frac{3}{2} - \ln 2$

四、解答题: 本题共6小题, 共70分。

17. 解: 论断①中, 由余弦定理得  $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{ac}{2ac} = \frac{1}{2}$ , ..... 1分

由  $B \in (0, \pi)$ , 得  $B = \frac{\pi}{3}$ . ..... 2分

论断②中, 因为  $c = 2b \cos B$ , 由正弦定理得,  $\sin C = 2 \sin B \cos B = \sin 2B$ , ..... 3分

因为角  $B, C$  是  $\triangle ABC$  的内角, 所以  $C = 2B$  或  $C + 2B = \pi$ . ..... 5分

论断③中, 由正弦定理得,  $\sin A \cos C + \sqrt{3} \sin A \sin C = \sin B + \sin C$ ,

即  $\sin A \cos C + \sqrt{3} \sin A \sin C = \sin(A + C) + \sin C$ , ..... 6分

即  $\sin A \cos C + \sqrt{3} \sin A \sin C = \sin A \cos C + \cos A \sin C + \sin C$ ,



即  $\sqrt{3}\sin A \sin C = \cos A \sin C + \sin C$ , 又因为  $\sin C \neq 0$ , 所以  $\sqrt{3}\sin A = \cos A + 1$ , ..... 7分

得  $\sin\left(A - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$ , 又因为  $A \in (0, \pi)$ , 所以  $A - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$ , 得  $A = \frac{\pi}{3}$ . ..... 8分

以其中两个论断作为条件, 余下的一个论断作为结论, 所有可能的真命题有:

①③ $\Rightarrow$ ②和①② $\Rightarrow$ ③. .... 10分

18. (1) 证明: 如右图, 连接  $AE$ , 由题意知  $AB$  为  $\odot O$  的直径, 所以  $AE \perp BE$ . .... 1分

因为  $AD, EF$  是圆柱的母线, 所以  $AD \parallel EF$  且  $AD = EF$ . 所以四边形  $AEDF$  是平行四边形.

所以  $AE \parallel DF$ .

所以  $BE \perp DF$ . .... 2分

因为  $EF$  是圆柱的母线, 所以  $EF \perp$  平面  $AEB$ .

又因为  $BE \subset$  平面  $AEB$ ,

所以  $EF \perp BE$ . .... 3分

又因为  $DF \cap EF = F$ ,  $DF, EF \subset$  平面  $DEF$ ,

所以  $BE \perp$  平面  $DEF$ . .... 4分

(2) 解: 由 (1) 知  $BE$  是三棱锥  $B-DEF$  底面  $DEF$  上的高,

由 (1) 知  $EF \perp AE$ ,  $AE \parallel DF$ , 所以  $EF \perp DF$ , 即底面三角形  $DEF$  是直角三角形.

设  $DF = AE = x$ ,  $BE = y$ , 则  $x^2 + y^2 = 4$ .

$$\text{所以 } V_{B-DEF} = \frac{1}{3} S_{\triangle DEF} \cdot BE = \frac{1}{3} \times \left( \frac{1}{2} \times x \times x \right) \times y = \frac{1}{3} xy \leq \frac{1}{3} \cdot \frac{x^2 + y^2}{2} = \frac{2}{3},$$

当且仅当  $x = y = \sqrt{2}$  时等号成立, 即点  $E, F$  分别是  $\widehat{AB}, \widehat{CD}$  的中点时, 三棱锥  $B-DEF$  的体积最大. .... 8分

(下求二面角  $B-DF-E$  的余弦值)

方法一: 由 (1) 得  $BE \perp$  平面  $DEF$ , 因为  $DF \subset$  平面  $DEF$ , 所以  $BE \perp DF$ . .... 9分

又因为  $EF \perp DF$ ,  $EF \cap BE = E$ , 所以  $DF \perp$  平面  $BEF$ . 因为  $BF \subset$  平面  $BEF$ , 所以  $BF \perp DF$ . 所以  $\angle BFE$  是二面角  $B-DF-E$  的平面角. .... 10分

由 (1) 知  $\triangle BEF$  为直角三角形, 则  $BF = \sqrt{(\sqrt{2})^2 + 2^2} = \sqrt{6}$ . .... 11分

$$\text{故 } \cos \angle BFE = \frac{EF}{BF} = \frac{2}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{3}.$$

所以二面角  $B-DF-E$  的余弦值为  $\frac{\sqrt{6}}{3}$ . .... 12分



方法二: 由 (1) 知  $EA, EB, EF$  两两相互垂直, 如右图, 以点  $E$  为原点,  $EA, EB, EF$  所在直线为  $x, y, z$  轴建立空间直角坐标系  $E-xyz$ ,

则  $B(0, \sqrt{2}, 0), D(\sqrt{2}, 0, 2), E(0, 0, 0), F(0, 0, 2)$ .

..... 9分

易知平面  $DEF$  的法向量为  $\vec{EB} = (0, \sqrt{2}, 0)$ .

设平面  $BDF$  的法向量为  $\vec{n} = (x, y, z)$ , 由  $\vec{DF} = (-\sqrt{2}, 0, 0), \vec{BF} = (0, -\sqrt{2}, 2)$ ,





得  $\begin{cases} \vec{n} \cdot \vec{DF} = 0, \\ \vec{n} \cdot \vec{BF} = 0, \end{cases}$  即  $\begin{cases} -\sqrt{2}x = 0, \\ -\sqrt{2}y + 2z = 0, \end{cases}$  即  $\begin{cases} x = 0, \\ y = \sqrt{2}z, \end{cases}$  取  $z = 1$ , 得  $\vec{n} = (0, \sqrt{2}, 1)$ . ..... 10 分

设二面角  $B-DF-E$  的平面角为  $\theta$ ,

则  $|\cos \theta| = |\cos \langle \vec{n}, \vec{EB} \rangle| = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{EB}|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{EB}|} = \frac{\sqrt{2} \times \sqrt{2}}{\sqrt{3} \times \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$ . ..... 11 分

由图可知  $\theta$  为锐角, 所以二面角  $B-DF-E$  的余弦值为  $\frac{\sqrt{6}}{3}$ . ..... 12 分

19. (1) 证明: 由题意可得,  $a_1 = 1$ . 当  $n \geq 2$  时,  $a_n = S_n - S_{n-1}$ ,  
 所以  $(S_n - S_{n-1})[2S_n - (S_n - S_{n-1})] = 1$ , ..... 2 分  
 得  $S_n^2 - S_{n-1}^2 = 1$ . ..... 3 分  
 又  $S_1^2 = a_1^2 = 1$ ,  
 所以  $\{S_n^2\}$  是以 1 为首项, 1 为公差的等差数列. .... 4 分  
 所以  $S_n^2 = n$ . ..... 5 分  
 因为  $\{a_n\}$  是正项数列, 所以  $S_n > 0$ . 故  $S_n = \sqrt{n}$ . ..... 6 分

(2) 解: 不存在.

理由如下:

当  $n \geq 2$  时,  $a_n = S_n - S_{n-1} = \sqrt{n} - \sqrt{n-1}$ , ..... 7 分

因为  $a_1 = 1$ , 所以对于  $n \in \mathbf{N}^*$ , 都有  $a_n = \sqrt{n} - \sqrt{n-1}$ . ..... 8 分

则  $\frac{1}{a_n} = \frac{1}{\sqrt{n} - \sqrt{n-1}} = \sqrt{n} + \sqrt{n-1}$ . ..... 9 分

假设存在满足要求的连续三项  $a_k, a_{k+1}, a_{k+2}$ , 使得  $\frac{1}{a_k}, \frac{1}{a_{k+1}}, \frac{1}{a_{k+2}}$  构成等差数列,

则  $2(\sqrt{k+1} + \sqrt{k}) = \sqrt{k} + \sqrt{k-1} + \sqrt{k+2} + \sqrt{k+1}$ .

即  $\sqrt{k+1} + \sqrt{k} = \sqrt{k-1} + \sqrt{k+2}$ . ..... 10 分

两边同时平方, 得  $k+1+k+2\sqrt{k+1}\sqrt{k} = k-1+k+2+2\sqrt{k-1}\sqrt{k+2}$ .

即  $(k+1)k = (k-1)(k+2)$ .

因为  $k^2 + k = k^2 + k - 2$  显然不成立, 与假设矛盾, ..... 11 分

所以数列  $\{a_n\}$  中不存在满足要求的连续三项. .... 12 分

20. 解: (1) 用  $A, B, C$  分别表示篮球, 羽毛球, 游泳三种运动项目, 用  $P_n(A), P_n(B), P_n(C)$  ( $n \in \mathbf{N}^*$ ) 分别表示第  $n$  天小王进行  $A, B, C$  三种运动项目的概率. .... 1 分

因为小王第一天打羽毛球,

所以第 2 天小王做三项运动的概率分别为  $P_2(A) = 0.3, P_2(B) = 0.1, P_2(C) = 0.6$ . ..... 2 分

第 3 天小王做三项运动的概率分别为  $P_3(A) = P_2(A) \times 0.5 + P_2(B) \times 0.3 + P_2(C) \times 0.3 = 0.36$ ,

$P_3(B) = P_2(A) \times 0.2 + P_2(B) \times 0.1 + P_2(C) \times 0.6 = 0.43$ ,

$P_3(C) = P_2(A) \times 0.3 + P_2(B) \times 0.6 + P_2(C) \times 0.1 = 0.21$ , ..... 4 分

所以小王第三天打羽毛球的可能性最大. .... 5 分



(2) 小王从第一天打羽毛球开始,前三天的运动项目安排有:  $BAA, BAB, BAC, BBA, BBB, BBC, BCA, BCB, BCC$  共 9 种,  
 运动能量消耗总数用  $X$  表示,有 1200, 1300, 1400, 1500, 1600 共 5 种可能, … 6 分  
 $P(X=1200) = P(BBB) = 0.1 \times 0.1 = 0.01$ ,  
 $P(X=1300) = P(BAB) + P(BBA) = 0.3 \times 0.2 + 0.1 \times 0.3 = 0.09$ ,  
 $P(X=1400) = P(BAA) + P(BBC) + P(BCB) = 0.3 \times 0.5 + 0.1 \times 0.6 + 0.6 \times 0.6 = 0.57$ ,  
 $P(X=1500) = P(BAC) + P(BCA) = 0.3 \times 0.3 + 0.6 \times 0.3 = 0.27$ ,  
 $P(X=1600) = P(BCC) = 0.6 \times 0.1 = 0.06$ , …………… 9 分

所以小王从第一天打羽毛球开始,前三天参加体育运动能量消耗总数  $X$  的分布列为

$X$	1200	1300	1400	1500	1600
$P$	0.01	0.09	0.57	0.27	0.06

…………… 10 分

能量消耗总数  $X$  的期望

$$E(X) = 1200 \times 0.01 + 1300 \times 0.09 + 1400 \times 0.57 + 1500 \times 0.27 + 1600 \times 0.06 = 1428 \text{ (卡)}.$$

所以小王从第一天打羽毛球开始,前三天参加体育运动能量消耗总数  $X$  的期望为 1428 卡. …………… 12 分

21. (1) 解: 因为  $f'(x) = \frac{1}{x} + a = \frac{ax+1}{x} (x>0)$ , …………… 1 分

所以,当  $a \geq 0$  时,  $f(1) = a + 1 > 0$  不符合题意. …………… 2 分

当  $a < 0$  时,令  $f'(x) < 0$ ,得  $x > -\frac{1}{a}$ ;令  $f'(x) > 0$ ,得  $0 < x < -\frac{1}{a}$ ,

所以  $f(x)$  在区间  $(0, -\frac{1}{a})$  上单调递增,在区间  $(-\frac{1}{a}, +\infty)$  上单调递减, …………… 3 分

由题得  $f(-\frac{1}{a}) = \ln(-\frac{1}{a}) \leq 0$ ,解得  $a \leq -1$ . …………… 4 分

所以  $a \leq -1$ .

综上所述  $a \leq -1$ . …………… 5 分

(2) 证明: 设  $g(x) = f'(x) - \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2}$ ,问题转化为  $g(x)$  在区间  $(x_1, x_2)$  上有唯一的零点, …………… 6 分

由  $g(x) = f'(x) - \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} = \frac{1}{x} + a - \frac{\ln x_1 + ax_1 - \ln x_2 - ax_2}{x_1 - x_2}$ ,易知  $g(x)$  在区间  $(x_1, x_2)$  上单调递减,故函数  $g(x)$  在区间  $(x_1, x_2)$  上至多有 1 个零点, …………… 7 分

$$\text{由 } g(x_1) = f'(x_1) - \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} = \frac{1}{x_1} + a - \frac{\ln x_1 + ax_1 - \ln x_2 - ax_2}{x_1 - x_2} =$$

$$\frac{1}{x_1} - \frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2} = \frac{1}{x_1 - x_2} \left( 1 - \frac{x_2}{x_1} + \ln \frac{x_2}{x_1} \right),$$

同理,得  $g(x_2) = \frac{1}{x_1 - x_2} \left( \frac{x_1}{x_2} - 1 + \ln \frac{x_2}{x_1} \right)$ , …………… 8 分

由 (1) 知,当  $a = -1$  时,  $\ln x - x + 1 \leq 0$ ,当且仅当  $x = 1$  时取等号, …………… 9 分

因为  $0 < x_1 < x_2$ ,所以  $\frac{x_2}{x_1} > 1$ ,

所以  $\ln \frac{x_2}{x_1} - \frac{x_2}{x_1} + 1 < 0$ ,

又因为  $x_1 - x_2 < 0$ , 即  $\frac{1}{x_1 - x_2} < 0$ , 所以  $g(x_1) > 0$ , ..... 10 分

因为  $0 < x_1 < x_2$ , 所以  $0 < \frac{x_1}{x_2} < 1$ ,

所以  $\ln \frac{x_1}{x_2} - \frac{x_1}{x_2} + 1 < 0$ , 即  $\ln \frac{x_2}{x_1} + \frac{x_1}{x_2} - 1 > 0$ ,

又因为  $x_1 - x_2 < 0$ , 即  $\frac{1}{x_1 - x_2} < 0$ , 所以  $g(x_2) < 0$ , ..... 11 分

由函数零点存在定理知  $g(x)$  在区间  $(x_1, x_2)$  上有唯一的零点, 即存在唯一的  $x_0 \in$

$(x_1, x_2)$ , 使得  $f'(x_0) = \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2}$  成立. .... 12 分


22. 解: (1) 由题可知  $c = \sqrt{3}$ , ..... 1 分

当点  $M$  在  $x$  轴上时,  $|PQ| = \sqrt{3}$ , 不妨设  $P(b, \frac{\sqrt{3}}{2})$ , ..... 2 分

$$\text{得} \begin{cases} a^2 - b^2 = 3, \\ \frac{b^2}{a^2} + \frac{3}{4} = 1, \end{cases} \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

解得  $\begin{cases} a = 2, \\ b = 1. \end{cases}$  所以椭圆  $C$  的标准方程为  $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ . .... 4 分

(2) 设  $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$ ,



$$\text{则 } |PF| = \sqrt{(x_1 - \sqrt{3})^2 + (y_1 - 0)^2} = \sqrt{(x_1 - \sqrt{3})^2 + 1 - \frac{x_1^2}{4}} = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x_1 - 2\right)^2} = 2 - \frac{\sqrt{3}}{2}x_1.$$

$$\text{同理 } |QF| = 2 - \frac{\sqrt{3}}{2}x_2, \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$|PM| = \sqrt{OP^2 - b^2} = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 - 1} = \sqrt{x_1^2 - \frac{x_1^2}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}|x_1|.$$

$$\text{同理 } |QM| = \frac{\sqrt{3}}{2}|x_2|.$$

所以  $\triangle FPQ$  的周长为



$$2 - \frac{\sqrt{3}}{2}x_1 + 2 - \frac{\sqrt{3}}{2}x_2 + \frac{\sqrt{3}}{2}|x_1| + \frac{\sqrt{3}}{2}|x_2| = 4 + \sqrt{3} \frac{|x_1| + |x_2| - x_1 - x_2}{2}. \dots\dots\dots 6 \text{分}$$

①当直线  $PQ$  的斜率不存在时,  $PQ$  的方程为  $x = 1$  或  $x = -1$ .

$PQ$  的方程为  $x = 1$  时, 不妨设  $P, Q$  的坐标分别为  $(1, \frac{\sqrt{3}}{2}), (1, -\frac{\sqrt{3}}{2})$ , 此时  $\triangle FPQ$  的周长为 4.

$PQ$  的方程为  $x = -1$  时, 不妨设  $P, Q$  的坐标分别为  $(-1, \frac{\sqrt{3}}{2}), (-1, -\frac{\sqrt{3}}{2})$ , 此时  $\triangle FPQ$  的周长为  $4 + 2\sqrt{3}$ .  $\dots\dots\dots 7 \text{分}$

②当直线  $PQ$  的斜率存在时, 设  $PQ$  的方程为  $y = kx + m$ ,

由直线  $PQ$  与圆  $x^2 + y^2 = 1$  相切, 得  $d = \frac{|m|}{\sqrt{1+k^2}} = 1$ , 即  $m^2 = 1 + k^2$ .  $\dots\dots\dots 8 \text{分}$

联立得  $\begin{cases} y = kx + m, \\ \frac{x^2}{4} + y^2 = 1. \end{cases}$  化简得  $(1 + 4k^2)x^2 + 8kmx + 4m^2 - 4 = 0$ .

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{8km}{1 + 4k^2}, \\ x_1 x_2 = \frac{4m^2 - 4}{1 + 4k^2}. \end{cases} \text{易知 } \Delta > 0 \text{ 恒成立, } \dots\dots\dots 9 \text{分}$$

$$x_1 x_2 = \frac{4m^2 - 4}{1 + 4k^2} = \frac{4k^2}{1 + 4k^2} > 0, \text{ 即 } x_1, x_2 \text{ 同号,}$$

当  $x_1 + x_2 = -\frac{8km}{1 + 4k^2} > 0$  时, 即  $km < 0$ , 此时点  $M$  在  $y$  轴右侧, 所以  $x_1 > 0, x_2 > 0$ .

此时  $\triangle FPQ$  的周长  $= 4 + \sqrt{3} \frac{|x_1| + |x_2| - x_1 - x_2}{2} = 4$  为定值.  $\dots\dots\dots 10 \text{分}$

当  $x_1 + x_2 = -\frac{8km}{1 + 4k^2} < 0$  时, 即  $km > 0$ , 此时点  $M$  在  $y$  轴左侧, 所以  $x_1 < 0, x_2 < 0$ .

$$\text{此时 } \triangle FPQ \text{ 的周长} = 4 + \sqrt{3} \frac{|x_1| + |x_2| - x_1 - x_2}{2} = 4 - \sqrt{3}(x_1 + x_2) = 4 + \frac{8\sqrt{3}km}{1 + 4k^2} =$$

$$4 + \frac{8\sqrt{3}km}{m^2 + 3k^2} = 4 + \frac{8\sqrt{3}}{\frac{m}{k} + 3\frac{k}{m}}. \dots\dots\dots 11 \text{分}$$

因为  $km > 0$ , 所以  $\frac{m}{k} + 3\frac{k}{m} \geq 2\sqrt{3}$ , 当且仅当  $\frac{m}{k} = 3\frac{k}{m}$ , 即  $\begin{cases} m = \frac{\sqrt{6}}{2}, \\ k = \frac{\sqrt{2}}{2}, \end{cases}$  或  $\begin{cases} m = -\frac{\sqrt{6}}{2}, \\ k = -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$  时取

等号.

从而  $4 < 4 + \frac{8\sqrt{3}}{\frac{m}{k} + 3\frac{k}{m}} \leq 8$ , 所以  $\triangle FPQ$  周长的取值范围为  $(4, 8]$ .

综上所述,  $\triangle FPQ$  周长的取值范围为  $[4, 8]$ .  $\dots\dots\dots 12 \text{分}$

## 关于我们

北京高考在线创办于 2014 年，隶属于北京太星网络科技有限公司，是北京地区极具影响力的中学升学服务平台。主营业务涵盖：北京新高考、高中生涯规划、志愿填报、强基计划、综合评价招生和学科竞赛等。

北京高考在线旗下拥有网站门户、微信公众平台等全媒体矩阵生态平台。平台活跃用户 40W+，网站年度流量数千万量级。用户群体立足于北京，辐射全国 31 省市。

北京高考在线平台一直秉承“精益求精、专业严谨”的建设理念，不断探索“K12 教育+互联网+大数据”的运营模式，尝试基于大数据理论为广大中学和家长提供新鲜的高考资讯、专业的高考政策解读、科学的升学规划等，为广大高校、中学和教科研单位提供“衔接和桥梁纽带”作用。

平台自创办以来，为众多重点大学发现和推荐优秀生源，和北京近百所中学达成合作关系，累计举办线上线下升学公益讲座数百场，帮助数十万考生顺利通过考入理想大学，在家长、考生、中学和社会各界具有广泛的口碑影响力

未来，北京高考在线平台将立足于北京新高考改革，基于对北京高考政策研究及北京高校资源优势，更好的服务全国高中家长和学生。



微信搜一搜

北京高考资讯